

**U N I V E R S I D A D D E C O N C E P C I Ó N**  
**FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS**  
**Departamento de Ciencias Pecuarias**



**FRECUENCIA DE DECOMISOS POR LESIONES TUBERCULOSAS EN  
BOVINOS, EN UNA PLANTA FAENADORA DE CARNES DE LA REGIÓN DEL  
BÍOBÍO, DURANTE LOS AÑOS 2011 - 2012**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO A  
LA FACULTAD DE CIENCIAS  
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE  
CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO DE  
MÉDICO VETERINARIO**

**PAMELA URREA SEGURA**  
**CONCEPCIÓN - CHILE**  
**2015**

## I. RESUMEN

### FRECUENCIA DE DECOMISOS POR LESIONES TUBERCULOSAS EN BOVINOS, EN UNA PLANTA FAENADORA DE CARNES DE LA REGIÓN DEL BÍOBÍO, DURANTE LOS AÑOS 2011 - 2012

### FREQUENCY OF REJECTIONS DUE TO BOVINE TUBERCULOSIS LESIONS IN A SLAUGHTERHOUSE AT THE BÍOBÍO REGION DURING THE 2011-2012 PERIOD

Se realizó un análisis comparativo de los diferentes decomisos por lesiones tuberculosas (LT) en bovinos faenados en una planta faenadora de carne de la Región del BíoBío durante el periodo 2011 - 2012. Para este estudio se utilizaron los registros obtenidos por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) basados en el hallazgo de LT durante la inspección *post mortem* oficial de canales y órganos de todos los animales faenados en dicho establecimiento y periodo. El porcentaje de decomisos debido a LT fue de 0,76% en el año 2011 y de 0,57% en el año 2012, con una tendencia a la disminución del 0,19% en el periodo analizado. Los decomisos totales representan un 30% y los parciales un 70%. De los órganos o zonas decomisadas la cabeza representa un 41,8%, seguida de los pulmones 32,4% y vísceras verdes 19,8%. En relación a las clases faenadas en la PFC analizada, la clase "vaca" fue la más afectada con LT (1,17%).

**Palabras clave:** tuberculosis bovina, *Mycobacterium bovis*, matadero, registros.