

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

DIRECCION DE POSTGRADO



**PERFIL DE LA VAGINOSIS BACTERIANA EN MUJERES QUE TIENEN
SEXO CON MUJERES.**



**TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA.**

Por

Lorena Alarcón Barra.

Profesora Guía: Apolinaria García Cancino.

2012.

RESUMEN.

“Perfil de la Vaginosis Bacteriana en Mujeres que tienen sexo con Mujeres”.

La Vaginosis Bacteriana (VB) es considerada por muchos como una alteración inofensiva de la microbiota vaginal; sin embargo, ha sido vinculada a complicaciones ginecológicas y obstétricas como infección intraamniótica, parto prematuro y prematuridad, incremento del riesgo de adquisición del HIV. La VB es común en mujeres que tienen sexo con mujeres y las bacterias vaginales presentes en ellas son similares a aquellas asociadas a la VB en mujeres heterosexuales. **Objetivo.** Evaluar la frecuencia de Vaginosis Bacteriana en un grupo de mujeres que tienen sexo con mujeres y determinar el perfil clínico y de hábitos sexuales. **Material y Método.** Investigación de tipo descriptiva transversal en la que fueron incluidas 30 mujeres que tienen sexo con mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 22 y 44 años. A cada participante se le realizó una entrevista y evaluación clínica ginecológica obteniendo una muestra vaginal de fondo de saco anterior para frotis con tinción de Gram. Posteriormente, se obtuvo una muestra del canal endocervical previa limpieza del exocérvix, para realizar tinción de Gram. **Resultados.** La edad promedio de las participantes fue de 33 años y con una escolaridad superior (46.6%); el 80% declaró estar soltera y un 90% se considera bisexual. Un 16.6% afirmó haber consumido drogas y un 86.6 % consume alcohol. La distribución de los estadios vaginales correspondió en un 23% a estadio intermedio, 23% con VB y un 54% normal. **Conclusión.** La presencia de VB se presentó en las mujeres bisexuales y con prácticas sexuales de tipo vaginales y tribadismo.