



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
INGENIERÍA EN CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES

**GUÍA DE CAMPO DE AVES PRESENTES EN EL PARQUE MUSEO PEDRO
DEL RÍO ZAÑARTU, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO**

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Concepción para optar al título profesional de
Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales

Por: Catalina Katuska Romero San Martín

Profesor Guía: Eduardo Peña Fernández

Junio, 2024

Concepción, Chile

© 2024, Catalina Katuska Romero San Martín

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento

GUÍA DE CAMPO DE AVES PRESENTES EN PARQUE MUSEO PEDRO DEL
RÍO ZAÑARTU, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO




Profesor Guía

Eduardo Peña Fernández

Profesor asociado

Ingeniero Forestal, Dr.



Profesor Guía

Catalina Reyes Carcamo

Colaboradora Académica

Ing. en Conservación de Recursos Naturales

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA	6
2.1 Descripción del área de estudio	6
2.2 Recopilación de datos	6
2.3 Desarrollo de información obtenida	7
2.4 Procesamiento de datos	8
III. RESULTADOS	9
3.1 Especies presentes en el PMPRZ	10
3.2 Especies por orden y familias presentes en el PMPRZ	15
IV. DISCUSIÓN	20
V. CONCLUSIONES	28
VI. GLOSARIO	29
VII. BIBLIOGRAFÍA	31
VIII. APÉNDICE	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1. Especies observadas por visita y estación del año en Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío
9

Tabla 3.2. Especies de praderas, matorrales y bosques presentes en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío
11

Tabla 3.3. Especies de humedales y ambientes acuáticos presentes en Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío
13

Tabla 3.4. Órdenes, familias y especies identificadas en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío
15

Tabla 3.5. Especies de aves del Parque Museo Pedro del Río Zañartu en estado de conservación casi amenazado (NT) según IUCN 2019
16

Tabla 3.6. Orden, familias y especies de aves presentes en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío
17

Tabla 3.7. Identificación de las 10 especies con un 80% y más de avistamientos en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío
17

Tabla 3.8. Especies con solo un avistamiento en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío
18

RESUMEN

Las actividades productivas tales como la agricultura, ganadería y forestal han generado una severa reducción de la biodiversidad, razón por lo cual en muchas regiones del mundo los ecosistemas naturales redujeron su tamaño o solo son fragmentos de la vegetación original. Los remanentes de vegetación son elementos vitales para proteger la biodiversidad, pero lamentablemente en muchos de ellos no se conoce en detalle las especies que existen. Un ejemplo de esto es el caso del Parque Museo Pedro del Río Zañartu en la comuna de Hualpén, Región del Biobío, donde a pesar de que es una de las áreas de recreación más importante de la zona, aún no se tiene completo el listado de flora y fauna. Por ello, con el fin de identificar las especies de avifauna presentes en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu se analizaron datos de 81 avistamiento de aves registrados durante las cuatro estaciones del año en un lapso de un poco más de 10 años. Las aves fueron clasificadas por orden, familia y estado de conservación. A lo largo del muestreo realizado, más algunos registros del año 2023, se observó un total de 112 especies, siendo el orden Passeriformes el más abundante. Solo cuatro del total de especies se encuentran en un estado de conservación casi amenazado. Para cada especie identificada se realizó una ficha técnica con sus características físicas, distribución y hábitat.

ABSTRACT

Productive activities such as agriculture, livestock and forestry have generated a severe reduction in biodiversity, which is why in many regions of the world natural ecosystems have reduced their size or are only fragments of the original vegetation. Vegetation remnants are vital elements to protect biodiversity, but unfortunately in many of them the species that exist are not known in detail. An example of this is the case of the Pedro del Río Zañartu Park in the commune of Hualpén, Biobío Region, where although it is one of the most important recreation areas in the area, the list of flora and fauna is not complete. Therefore, to identify the bird species, present in the Pedro del Río Zañartu Park, data from 81 bird sightings recorded during the four seasons of the year in a period of a little more than 10 years were analyzed. The birds were classified by order, family and conservation status. Over 10 years, plus some records made in 2023, a total of 112 species were observed, with the Passeriformes order being the most abundant. Only four of the total species are in a nearly threatened conservation status. For each identified species, a technical sheet was made with its physical characteristics, distribution, and habitat.

I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha puesto especial interés en la conservación de la flora y fauna de Chile, pero ¿qué necesitamos para conservar?, primeramente, debemos conocer el entorno y las especies presentes en los ecosistemas que se desean conservar. A pesar de ello, en una gran mayoría de las áreas de conservación no se conoce en detalle la diversidad presente, siendo esta una importante debilidad (Conaf, 2001), por ejemplo, en julio de 2018 el director ejecutivo de Conaf (Corporación Nacional Forestal) informaba a la cámara de diputados que 17 de 101 unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE) no tenían plan de manejo. En el mismo año, Petit et al. (2018) señala que solo un 12% de las unidades del SNASPE son efectivamente manejadas. Por ello, en algunas unidades del SNASPE no existe un listado actualizado de plantas y de aves, el conocimiento de ambos recursos, en especial las aves, es fundamental para la planificación de los planes de manejo. Considerando lo anterior, este trabajo se basó en la identificación de las aves del Parque Museo Pedro del Río Zañartu (PMPRZ) de la comuna de Hualpén en la Región del Biobío.

La biodiversidad está cambiando a paso rápido, la degradación y pérdida de ecosistemas se ha vuelto uno de los mayores problemas para la avifauna, ya que, al perder su hábitat quedan expuestas a un mayor número de amenazas. Las

aves son indicadores de la salud del ecosistema ya que ocupan un amplio rango en los niveles tróficos y en la cadena alimenticia, además que están ampliamente distribuidas, presentan un periodo de vida largo y son sensibles a cambios atmosféricos del ambiente (Parra, 2014).

Actualmente, a nivel mundial existen alrededor de 1300 especies amenazadas, 232 en peligro crítico, 405 en peligro y 717 vulnerables (IUCN, 2023); en Chile existen 528 especies nativas de las cuales 12 son endémicas; nueve especies en Chile continental y tres especies en el Archipiélago Juan Fernández y representan el 5% de especies a nivel mundial, de estas 115 (alrededor de un 22%) se encuentra amenazada, casi amenazada o con datos insuficientes (MMA, 2022).

Desde una perspectiva ornitológica Chile es ecológicamente como una isla, aislada por el océano, el desierto y los Andes (Jaramillo, 2004). Como muchas islas, muestra una avifauna que es distintiva; Chile forma parte importante de ecosistemas con un alto grado de endemismo de estas especies, además posee hábitats mundialmente reconocidos para la conservación de aves (MMA, 2022).

Algunas de las amenazas más significativas para la avifauna chilena son el cambio climático el cual afecta distribución, abundancia y persistencia de especies y/o sus ecosistemas, la introducción de especies exóticas, las cuales

pueden afectar de manera directa o indirecta, por ejemplo, genera competencia entre especies o transmisión de enfermedades. Sin embargo, no se puede dejar fuera una de las amenazas actuales más dañinas en términos de ecosistema y hábitat para la avifauna, el cambio de uso de suelo puede llegar a provocar un aislamiento debido a la fragmentación de parches naturales de vegetación, esto afecta la densidad y composición de especies que allí habitan (MMA, 2022).

Chile es un sitio de importancia mundial para la conservación de aves, sin embargo, poco queda de su vegetación original, se estima que Chile ha perdido alrededor del 50% de su bosque original (Del Pozo, 2013), esto debido a la expansión agrícola-ganadera en mayor medida y posteriormente la expansión forestal, la que se proyecta siga aumentando sino se adoptan políticas públicas de desarrollo sostenible oportunas.

Alrededor de un 15% de la superficie del planeta y un 10% de aguas territoriales se encuentran protegidas (IUCN, 2016), esto está por debajo de la Meta Aichi número 11 que involucraba una protección del 17% para el año 2020, la cual esta emplaza bajo el objetivo C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. (CBD, 2020); a pesar de esto aún quedan muchas áreas claves para la biodiversidad expuestas a su destrucción.

Los Parques Nacionales en Chile continental se distribuyen en 43 unidades, las Reservas (Forestales y Nacionales) en 46, los Monumentos Naturales en 18 y los Santuarios de la Naturaleza comprenden 92 unidades. La protección asociada al SNASPE representa el 21,49% del territorio continental y los Santuarios de la Naturaleza adicionan 0,42%. Igualmente, la mayor concentración de Parques Nacionales se encuentra en las regiones de Aysén y Magallanes (Pliscoff, 2022). En la Región del Biobío el santuario de la naturaleza Península de Hualpén está conformado por 2.262 hectáreas, donde existen remanentes del “bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia* con algunos elementos florísticos característicos del bosque maulino” (Luebert & Pliscoff 2006) , es un relicto del llamado bosque costero del Biobío (Bevilacqua, 2019).

La península de Hualpén fue declarada Santuario de la Naturaleza el 10 de junio de 1976, tiene como objetivo resguardar y conservar tanto el patrimonio natural como cultural. Dentro de este también se encuentra el Parque Museo Pedro del Río Zañartu (PMPRZ), el cual ocupa una superficie de 552 hectáreas además de ser declarado Monumento Nacional (Monumentos Nacionales de Chile, 2023).

Dentro del santuario se informa de 104 especies de aves (Torres 2018) por ello, existen sitios de nidificación y alimentación tanto de aves residentes como migratorias, algunas de las cuales presentan problemas de conservación.

En el caso del PMPRZ que está incluido dentro de la península de Hualpén, el cual es altamente visitado por turistas, no tiene un inventario detallado de las especies de aves presentes en la unidad. Se pierde así una gran oportunidad de protección eficaz porque no se conoce lo que existe en ella, además de todo el potencial de educación que ello significa.

Por estas razones es imprescindible realizar un listado y ficha respectiva de cada ave que fue registrada en el PMPRZ, ya que esto permitiría entregar información tanto a los visitantes como a los encargados del parque en cuanto a la importancia de la preservación de estas especies y sus hábitats. Igualmente, esta permite realizar planes de manejo donde se incluya la conservación como un factor importante a considerar, ya que las aves cumplen un rol único en el ecosistema aportando para un mejor desarrollo de este.

II. METODOLOGÍA

2.1 Descripción del área de estudio

El área seleccionada para el desarrollo de guía de campo sobre aves es el Parque Museo Pedro del Río Zañartu (552 hectáreas) que es parte del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén perteneciente a la comuna de Hualpén, Región del Biobío. El santuario tiene una extensión de 2.662 hectáreas y el PMPRZ representa 21% aproximadamente del total de la península de Hualpén.

La península presenta un clima transitorio entre templado mediterráneo cálido y templado húmedo, gracias a esto y a su geografía existe alta biodiversidad de especies tanto nativas como exóticas. Existe una estructuración complementaria entre terrenos altos como cerros y mesetas y formaciones litorales, esto ayuda a que se originen diversos ecosistemas debido a la integración de ambientes terrestres y marinos (Monumentos Nacionales de Chile, 2024).

2.2 Recopilación de datos

Datos iniciales. Para el desarrollo del trabajo se dispone del registro de 78 visitas realizadas a lo largo del tiempo en el PMPRZ por el Dr. Eduardo Peña, quien es el profesor guía del presente proyecto de título. La duración de las visitas fue

entre 2,5 a 3 horas y la última visita se realizó en el año 2018. Considerando que en la primera visita para reconocer el área en el año 2023 se observó una especie de ave no incluida en los 78 registros previos se decidió realizar 3 visitas adicionales para determinar si nuevas especies se han agregado a las especies registradas previamente.

Procedimiento de muestreo. Las visitas consistieron en recorridos generales a través del predio registrando todas las especies observadas en cada visita. El tiempo de recorrido en cada visita fue de aproximadamente 3,5 horas (08:00 de la mañana a 11:30 am), similar al tiempo utilizado en las 78 visitas previas al año 2023.

2.3 Desarrollo de la información obtenida

La información recopilada permitió obtener la riqueza de aves del PMPRZ y también saber cuáles son las especies que son más frecuentes de observar en la unidad.

Para cada ave seleccionada se desarrolló una ficha con la descripción de la especie, nombre común, nombre científico, estado de conservación, identificación, hábitat y rango de distribución, esto con el fin de desarrollar una guía con información lo más detallada y exacta.

2.4 Procesamiento de datos

A partir de los datos obtenidos durante las visitas a terreno se procedió a identificar principalmente riqueza de especies, además se clasificaron de acuerdo con orden, familia, estado de conservación, frecuencia de avistamiento y la presencia de especies por estación del año en que fueron observadas. Esto proporcionará información relevante con respecto a que especies son más frecuentes o fáciles de encontrar en la zona.

III. RESULTADOS

En general sumando las 78 visitas realizadas durante 10 años más las 3 visitas realizadas en el año 2023 se dispuso de un total de 81 visitas, en un periodo que abarcó desde el mes de enero de 2010 hasta octubre del 2023.

Las visitas realizadas para la identificación de aves se distribuyeron a lo largo de las cuatro estaciones del año, pero con dominancia en otoño e invierno con el 64% de las visitas (Tabla 3.1). Durante el período de estudio se logró identificar un total de 112 especies de aves, lo cual indica una alta riqueza de aves, considerando que por cada visita se avistaron en promedio 40 especies distintas aproximadamente (Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Especies observadas por visita y estación del año en Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío.

Estaciones	Visitas (N°)	Frecuencia relativa por estación (%)	Promedio especies avistadas por visita (N°)	Total, especies avistadas por estación (N°)
Verano	19	23	36,5	84
Otoño	22	27	40,3	99
Invierno	30	37	42,7	100
Primavera	10	12	36,5	79
Total	81	100		

Al analizar los resultados de los avistamientos por estación, se observa que, de las 112 especies avistadas en total, 99 de ellas se pueden detectar en otoño y un total de 100 especies se detectan en invierno. En primavera y verano se detecta menor cantidad de especies 79 y 84 respectivamente (Tabla 3.1).

Los resultados indican que el promedio mínimo de especies que se observó en cada visita fue 36,5; la visita con menor observación fue de 9 especies y el máximo en una sola visita fue de 59 especies.

3.1 Especies presentes en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu

Las especies identificadas se distribuyeron entre aves de praderas, matorrales y bosques (Tabla 3.2) y aves de humedal y ambientes acuáticos (Tabla 3.3). De igual forma se resaltaron las especies de aves migratorias (**) e introducidas (*) las cuales serían 17 y 3 respectivamente, lo que equivale a un 15,2% y un 2,7% del total de 112 especies registradas.

Tabla 3.2. Especies de praderas, matorrales y bosques presentes en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío.

N°	Nombre Común	Nombre científico	Orden	Familia	IUCN 2019
1	Aguilucho	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	Accipitriformes	Accipitridae	LC
2	Bailarín	<i>Elanus leucurus</i>	Accipitriformes	Accipitridae	LC
3	Bailarín chico	<i>Anthus correndera</i>	Passeriformes	Motacillidae	LC
4	Bandurrilla	<i>Upucerthia dumetaria</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
5	Cachudito	<i>Anairetes parulus</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
6	Carpinterito	<i>Veniliornis lignarius</i>	Piciformes	Picidae	LC
7	Cernícalo	<i>Falco sparverius</i>	Falconiformes	Falconidae	LC
8	Chercán	<i>Troglodytes aedon</i>	Passeriformes	Troglodytidae	LC
9	Chincol	<i>Zonotrichia capensis</i>	Passeriformes	Emberizidae	LC
10	Chirihue	<i>Sicalis luteola</i>	Passeriformes	Thraupidae	LC
11	Chuncho	<i>Glaucidium nana</i>	Strigiformes	Strigidae	LC
12	Churrín de la mocha	<i>Eugralla paradoxa</i>	Passeriformes	Rhinocryptidae	LC
13	Churrín del norte	<i>Scytalopus fuscus</i>	Passeriformes	Rhinocryptidae	LC
14	Churrín del sur	<i>Scytalopus magellanicus</i>	Passeriformes	Rhinocryptidae	LC
15	Codorniz *	<i>Callipepla californica</i>	Galliformes	Odontophoridae	LC
16	Colegial	<i>Lessonia rufa</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
17	Colilarga	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
18	Comesebo grande	<i>Pygarrhichas albogularis</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
19	Cometocino patagónico	<i>Phrygilus patagonicus</i>	Passeriformes	Thraupidae	LC
20	Diuca	<i>Diuca diuca</i>	Passeriformes	Thraupidae	LC
21	Diucón	<i>Xolmis pyrope</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
22	Dormilona tontita **	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
23	Fio-fio **	<i>Elaenia albiceps</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
24	Gallina ciega	<i>Systellura longirostris</i>	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	LC
25	Golondrina chilena **	<i>Tachycineta leucopyga</i>	Passeriformes	Hirundinidae	LC
26	Golondrina dorso negro **	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Passeriformes	Hirundinidae	LC

27	Gorrión *	<i>Passer domesticus</i>	Passeriformes	Passeridae	LC
28	Halcón Peregrino **	<i>Falco peregrinus</i>	Falconiformes	Falconidae	LC
29	Hued Hued	<i>Pteroptochos tarnii</i>	Passeriformes	Rhinocryptidae	LC
30	Jilguero	<i>Spinus barbatus</i>	Passeriformes	Fringillidae	LC
31	Jote cabeza colorada	<i>Cathartes aura jota</i>	Cathartiformes	Cathartidae	LC
32	Jote cabeza negra	<i>Coragyps atratus foetens</i>	Cathartiformes	Cathartidae	LC
33	Lechuza	<i>Tyto alba</i>	Strigiformes	Tytonidae	LC
34	Loica	<i>Leistes loyca</i>	Passeriformes	Icteridae	LC
35	Mero	<i>Agriornis lividus</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
36	Mirlo *	<i>Molothrus bonariensis</i>	Passeriformes	Icteridae	LC
37	Nuco	<i>Asio flammeus</i>	Strigiformes	Strigidae	LC
38	Peuco	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Accipitriformes	Accipitridae	LC
39	Picaflor	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Apodiformes	Trochilidae	LC
40	Picaflor gigante	<i>Patagona gigas</i>	Apodiformes	Trochilidae	LC
41	Pitio	<i>Colaptes pitius</i>	Piciformes	Picidae	LC
42	Queltehue	<i>Vanellus chilensis</i>	Charadriiformes	Charadriidae	LC
43	Rara	<i>Phytotoma rara</i>	Passeriformes	Cotingidae	LC
44	Rayadito	<i>Aphrastura spinicauda</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
45	Tenca	<i>Mimus thenca</i>	Passeriformes	Mimidae	LC
46	Tijeral	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
47	Tiuque	<i>Milvago chimango</i>	Falconiformes	Falconidae	LC
48	Torcaza	<i>Patagioenas araucana</i>	Columbiformes	Columbidae	LC
49	Tordo	<i>Curaeus curaeus</i>	Passeriformes	Icteridae	LC
50	Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	Columbiformes	Columbidae	LC
51	Tortolita cuyana	<i>Columbina picui</i>	Columbiformes	Columbidae	LC
52	Traro	<i>Caracara plancus</i>	Falconiformes	Falconidae	LC
53	Tucúquere	<i>Bubo magellanicus</i>	Strigiformes	Strigidae	LC
54	Viudita **	<i>Colorhamphus parvirostris</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
55	Yal	<i>Phrygilus fruticeti</i>	Passeriformes	Thraupidae	LC
56	Zorzal	<i>Turdus falcklandii</i>	Passeriformes	Turdidae	LC

Tabla 3.3. Especies de humedales y ambientes acuáticos presentes en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío.

N°	Nombre Común	Nombre científico	Orden	Familia	IUCN 2019
1	Bandurria	<i>Theristicus melanopis</i>	Pelecaniformes	Threskiornithidae	LC
2	Becacina	<i>Gallinago paraguayae</i>	Charadriiformes	Scolopacidae	LC
3	Blanquillo	<i>Podiceps occipitalis</i>	Podicipediformes	Podicipedidae	LC
4	Chercán de las vegas	<i>Cistothorus platensis</i>	Passeriformes	Troglodytidae	LC
5	Chorlo chileno **	<i>Charadrius modestus</i>	Charadriiformes	Charadriidae	LC
6	Chorlo de collar **	<i>Charadrius collaris</i>	Charadriiformes	Charadriidae	LC
7	Chorlo de doble collar **	<i>Charadrius falklandicus</i>	Charadriiformes	Charadriidae	LC
8	Churrete	<i>Cinclodes patagonicus chilensis</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
9	Churrete acanelado	<i>Cinclodes fuscus</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
10	Churrete costero	<i>Cinclodes nigrofumosus</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC
11	Cisne coscoroba	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
12	Cisne cuello negro	<i>Cygnus melancoryphus</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
13	Cuervo de pantano	<i>Plegadis chihi</i>	Pelecaniformes	Threskiornithidae	LC
14	Garza boyera	<i>Bubulcus ibis</i>	Pelecaniformes	Ardeidae	LC
15	Garza chica	<i>Egretta thula</i>	Pelecaniformes	Ardeidae	LC
16	Garza cuca	<i>Ardea cocoi</i>	Pelecaniformes	Ardeidae	LC
17	Garza grande	<i>Ardea alba</i>	Pelecaniformes	Ardeidae	LC
18	Gaviota cahuil	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	Charadriiformes	Laridae	LC
19	Gaviota común	<i>Larus Dominicanus</i>	Charadriiformes	Laridae	LC
20	Gaviota de Franklin **	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Charadriiformes	Laridae	LC
21	Gaviota garuma	<i>Leucophaeus modestus</i>	Charadriiformes	Laridae	LC
22	Gaviotín elegante **	<i>Thalasseus elegans</i>	Charadriiformes	Laridae	NT
23	Gaviotín sudamericano	<i>Sterna hirundinacea</i>	Charadriiformes	Laridae	LC

24	Guanay **	<i>Phalacrocorax bouganvilli</i>	Suliformes	Phalacrocoracidae	NT
25	Huairavo	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Pelecaniformes	Ardeidae	LC
26	Huala	<i>Podiceps major</i>	Podicipediformes	Podicipedidae	LC
27	Lile	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	Suliformes	Phalacrocoracidae	NT
28	Pato capuchino	<i>Anas versicolor</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
29	Pato colorado	<i>Anas cyanoptera</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
30	Pato cuchara	<i>Anas platalea</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
31	Pato jergón chico	<i>Anas flavirostris</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
32	Pato jergón grande	<i>Anas georgica</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
33	Pato rana pico delgado	<i>Oxyura vittata</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
34	Pato real	<i>Anas sibilatrix</i>	Anseriformes	Anatidae	LC
35	Pelicano	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelecaniformes	Pelecanidae	NT
36	Perrito	<i>Himantopus mexicanus</i>	Charadriiformes	Recurvirostridae	LC
37	Picurio	<i>Podilymbus podiceps</i>	Podicipediformes	Podicipedidae	LC
38	Piden	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	Gruiformes	Rallidae	LC
39	Pilpilén	<i>Haematopus palliatus</i>	Charadriiformes	Haematopodidae	LC
40	Pilpilén negro	<i>Haematopus ater</i>	Charadriiformes	Haematopodidae	LC
41	Pimpollo	<i>Rollandia rolland</i>	Podicipediformes	Podicipedidae	LC
42	Piquero	<i>Sula variegata</i>	Suliformes	Sulidae	LC
43	Pitotoy chico **	<i>Tringa flavipes</i>	Charadriiformes	Scolopacidae	LC
44	Pitotoy grande **	<i>Tringa melanoleuca</i>	Charadriiformes	Scolopacidae	LC
45	Rayador	<i>Rynchops niger</i>	Charadriiformes	Laridae	LC
46	Runrun **	<i>Hymenops perspicillatus</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
47	Siete colores	<i>Tachuris rubrigastra</i>	Passeriformes	Tyrannidae	LC
48	Tagua	<i>Fulica armillata</i>	Gruiformes	Rallidae	LC
49	Tagua frente roja	<i>Fulica rufifrons</i>	Gruiformes	Rallidae	LC
50	Taguita	<i>Porphyriops melanops</i>	Gruiformes	Rallidae	LC
51	Trabajador	<i>Phleocryptes melanops</i>	Passeriformes	Furnariidae	LC

52	Trile	<i>Agelasticus thilius</i>	Passeriformes	Icteridae	LC
53	Vari	<i>Circus cinereus</i>	Accipitriformes	Accipitridae	LC
54	Yeco	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Suliformes	Phalacrocoracidae	LC
55	Zarapito **	<i>Numenius phaeopus</i>	Charadriiformes	Scolopacidae	LC
56	Zarapito de pico recto **	<i>Limosa haemastica</i>	Charadriiformes	Scolopacidae	LC

3.2 Especies por orden y familias presentes en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu

El listado de especies identificadas fue clasificado según Orden, Familia y Especie. De acuerdo con esto, se observó un total de 16 órdenes, 37 familias y 112 especies (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Órdenes, familias y especies identificadas en Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío.

Clasificación	Cantidad
N° Orden	16
Familias	37
Especies	112

Además, se clasificaron las especies según el Estado de Conservación, IUCN (2019). De acuerdo con ello, se identificaron 108 especies con clasificación de Preocupación menor (LC), correspondiente al 96,4 % de las especies identificadas, siendo el 3,6% restante clasificadas en estado de Casi Amenazado (Tabla 3.5).

Tabla 3.5. Especies de aves del Parque Museo Pedro del Río Zañartu en estado de conservación casi amenazadas (NT) según IUCN 2019.

Nombre común	Nombre científico	Orden	Familia	IUCN (2019)
Gaviotín elegante	<i>Thalasseus elegans</i>	Charadriiformes	Laridae	NT
Guanay	<i>Phalacrocorax bouganvilli</i>	Suliformes	Phalacrocoracidae	NT
Lile	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	Suliformes	Phalacrocoracidae	NT
Pelicano	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelecaniformes	Pelecanidae	NT

En relación con la frecuencia de avistamientos de especies, según clasificación de Familia y Orden, hay una clara tendencia de un orden, el cual cuenta con el 36,8% de las familias totales y el 36,6% de las especies identificadas (Tabla 3.6). El orden corresponde a Passeriformes, con 14 familias y 41 especies avistadas. Le sigue en relevancia de frecuencia de especies, el orden Charadriiformes con un 17%. Los órdenes restantes no alcanzan cada uno el 10% de frecuencia del total de especies (Tabla 3.7).

Tabla 3.6. Orden, familias y especies de aves presentes en Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío.

Orden	N° Familias	% del total	N° Especies	% del total
Passeriformes	14	37.8	41	36.6
Charadriiformes	5	13.5	19	17.0
Anseriformes	1	2.7	9	8.0
Pelecaniformes	3	8.1	8	7.1
Suliformes	2	5.4	4	3.6
Strigiformes	2	5.4	4	3.6
Otros (1)	10	27.0	27	24.1
Total	37	100	112	100

(1) Considera 10 órdenes con baja representación en familias y especies cada uno, por lo que fueron considerados en un dato en la elaboración de la tabla.

Tabla 3.7. Identificación de las 10 especies con un 80% y más de avistamientos en Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío.

Nombre común	Nombre científico	Orden	Familia	T.A	Avist. (%)
Trile	<i>Agelasticus thilius</i>	Passeriformes	Icteridae	79	97,5
Tiuque	<i>Milvago chimango</i>	Falconiformes	Falconidae	77	95,1
Diuca	<i>Diuca diuca</i>	Passeriformes	Thraupidae	77	95,1
Jote cabeza colorada	<i>Cathartes aura jota</i>	Cathartiformes	Cathartidae	76	93,8
Gaviota Cahuil	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	Charadriiformes	Laridae	75	92,6
Chercán	<i>Troglodytes aedon</i>	Passeriformes	Troglodytidae	75	92,6
Yeco	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Suliformes	Phalacrocoracidae	74	91,4
Gaviota común	<i>Larus Dominicanus</i>	Charadriiformes	Laridae	73	90,1
Jote cabeza negra	<i>Coragyps atratus foetens</i>	Cathartiformes	Cathartidae	71	87,7
Cachudito	<i>Anairetes parulus</i>	Passeriformes	Tyrannidae	70	86,4

Se identifica al Trile (*Agelasticus thilius*) como el ave presente en 79 de los 81 registros de datos, equivalente al 97,5%. Esta especie pertenece al orden Passeriformes al igual que Diuca (*Diuca diuca*), la cual estuvo presente en 77 de los 81 registros de datos.

Dentro del rango de 80% y más de avistamientos, se encontró un total de 6 de 16 órdenes (37,5%), 13 de 37 familias (35,1%) y 25 especies de 112 (13,4%), donde destacan las del orden Passeriformes.

Por otra parte, se analizan las especies con solo un avistamiento durante todo el periodo, correspondiente a una frecuencia de 1,2%, un total de 10 especies cumplen con esta frecuencia de identificación (Tabla 3.8).

Dentro del rango de 1,2% de avistamientos, se observan un total de 6 de 16 Órdenes (37,5%), 9 de 37 familias (24,3%) y 10 de 112 especies (8,9%), donde destacan las de Orden Passeriformes y Charadriiformes.

Tabla 3.8. Especies con solo un avistamiento en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, comuna de Hualpén, Región del Biobío.

Nombre común	Nombre científico	Orden	Familia	T.A	Avist. (%)
Bandurrilla	<i>Upucerthia dumetaria</i>	Passeriformes	Furnariidae	1	1,2
Chorlo doble collar	<i>Charadrius falklandicus</i>	Charadriiformes	Charadriidae	1	1,2
Comesebo grande	<i>Pygarrhichas albogularis</i>	Passeriformes	Furnariidae	1	1,2
Gallina ciega	<i>Systellura longirostris</i>	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	1	1,2
Gaviotín Sudamericano	<i>Sterna hirundinacea</i>	Charadriiformes	Laridae	1	1,2
Halcón Peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	Falconiformes	Falconidae	1	1,2
Mero	<i>Agriornis lividus</i>	Passeriformes	Tyrannidae	1	1,2
Picaflor Gigante	<i>Patagona gigas</i>	Apodiformes	Trochilidae	1	1,2
Tucúquere	<i>Bubo magellanicus</i>	Strigiformes	Strigidae	1	1,2
Yal	<i>Phrygilus fruticeti</i>	Passeriformes	Thraupidae	1	1,2

IV. DISCUSIÓN

La conservación de flora y fauna en Chile ha tomado mayor relevancia durante el último tiempo, sin embargo, enfrenta grandes desafíos para desarrollarse de una manera eficiente y productiva. El desconocimiento sobre la diversidad de especies existentes en las áreas de conservación y la falta de protección de estos entornos, son de los problemas más urgentes que se deben tratar. Por otro lado, aun cuando se cuenta con áreas protegidas, éstas no son suficientes para salvaguardar el patrimonio biológico y ecosistémico del país ya que, muchas áreas clave para la conservación aún siguen expuestas a la destrucción y explotación por parte de los seres humanos. Existen regiones como la de Tarapacá, Atacama, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble y Los Ríos que cuentan con dos o tres unidades SNASPE (Conaf, 2020).

La avifauna presente en Chile posee características únicas y es de vital importancia para mantener en pie un ecosistema saludable ya que cumplen funciones ecológicas como dispersión de semillas y polinización en plantas, además de control de plagas que ayudan a un desarrollo sustentable y armónico del entorno (Baquero y Cuellar, 2020).

La Península de Hualpén, territorio donde se emplaza el PMPRZ, cuenta con variados ecosistemas de gran importancia para la biodiversidad de la zona, tales

como humedales, bosque esclerófilo costero y ecosistemas marinos, estos otorgan refugio para más de 150 especies de aves residentes y migratorias, destacando tres IBAs (Important Birds Áreas) prioritarios para la conservación de las aves (Codeff, 2019).

El Parque Museo Pedro del Río Zañartu es un área de gran importancia biológica. Esto queda demostrado con la alta diversidad de aves que allí se encuentran, ya que en un periodo de muestreo aproximado de 10 años se ha identificado 112 especies, las cuales corresponden al 68% del total de 163 especies reportadas para toda la península de Hualpén (GCC Consultores, 2003), siendo la península cinco veces más grande en superficie (2,262 hectáreas) que el PMPRZ (552 hectáreas). En el listado de aves de la península se incluye especies pelágicas que en el caso del PMPRZ no fueron incluidas.

Las aves migratorias son capaces de recorrer grandes distancias, las cuales llegan a Chile entre octubre y diciembre, actualmente se han registrado 70 especies de aves que migran desde norte a sur, algunas de las que se encuentran en el Parque son zarapitos, gaviotas, gaviotines, chorlos, pitotoyes y patos entre otros. Una especie que migra en dirección sur a norte es el chorlo chileno (*Charadrius modestus*), el cual nidifica en Magallanes y pasa el invierno en la zona central y zona norte del país (Espejo y Espejo, 2022).

Al comparar con otros humedales similares de la Región del Biobío, se observa que en el PMPRZ se encontró un total de 56 especies de humedales y ambientes acuáticos, que es levemente superior a las especies reportadas para el humedal de Lenga donde se reportan 52 especies (Vera, 2017). Como en las zonas de bosques y praderas se encuentran otras 56 especies, el PMPRZ se transforma en un lugar muy atractivo para observar aves y realizar actividades de educación ambiental. El alto número de especies, 112 en total, sin duda que es parte de los recursos que llevaron a que el Ministerio del Medio Ambiente en diciembre de 2023 lo declarara “Santuario de la Naturaleza al Humedal Desembocadura del Río Biobío”, ubicado en la comuna de Hualpén (Decreto N°28, BCN 2023).

Sin duda que el hallazgo de 112 especies de aves en el PMPRZ, al compararse con otros humedales o sitios de conservación ve realizada su importancia. Por ejemplo, el total de 56 especies de humedales encontradas en el PMPRZ es mayor que las 45 especies descritas para el humedal Tubul-Raqui ubicado en la provincia de Arauco, Región del Biobío (Carrasco, 2004; Díaz, 2017), el cual es casi cuatro veces más extenso, 2.238 ha comparado a las 552 ha del PMPRZ.

La comparación entre ambos humedales realza la riqueza y diversidad presente en ambos ecosistemas. La diferencia de 11 especies a favor del PMPRZ puede darse debido a características específicas de cada área, por ejemplo, Tubul-Raqui es una zona de estuario, mientras que PMPRZ presenta diversos tipos de

ambientes, tanto terrestres como marinos, lo que genera condiciones más favorables para el asentamiento de avifauna. Igualmente se deben tomar en cuenta otros factores como disponibilidad de hábitat y recursos, además de la conectividad con otras áreas naturales.

Otro humedal de la zona central de Chile es el humedal del Río Maipo, ubicado en la Región de Valparaíso donde, a pesar de contar con relativamente poca superficie (60,3 hectáreas), se han identificado 181 especies, las cuales son representantes del 35% de la avifauna nacional, siendo el sector con mayor cantidad de registros para Chile (Monumentos Nacionales de Chile, 2020), es parte de la ruta migratoria americana, por lo que recibe miles de individuos provenientes del hemisferio norte.

En el PMPRZ existe un registro de 10 especies observadas una sola vez en todo el periodo de muestreo, uno de ellos es el Yal (*Phrygilus fruticeti*), que fue avistado únicamente durante el mes de mayo del año 2023. Existen también otras especies que se registraron en muy pocas oportunidades tales como, bandurrilla, mero, chorlo de doble collar, vari y pilpilén negro.

Al contrario de esto, hay un registro de 10 especies que fueron avistadas en más de un 80% de las visitas, siendo el Trile (*Agelasticus thilius*) el ave con mayor

frecuencia (79 de 81) seguido por el Tiuque (*Milvago chimango*) y la Diuca (*Diuca diuca*), ambos con 77 avistamientos en los 81 muestreos.

Las estaciones del año y la frecuencia del monitoreo realizado muestran la variación de especies a lo largo del año, destacando un mayor porcentaje de avistamientos y diversidad en invierno y otoño, mientras que primavera y verano presentan una menor cantidad de especies avistadas. También, 58% de las especies de aves de PMPRZ fueron registradas durante las cuatro estaciones del año. Igualmente, del total de especies hay 17 que son de carácter migratorio, lo que afecta la cantidad de veces que se pueden avistar en el PMPRZ.

Aunque se obtuvo un promedio de 40 especies registradas por visita, hubo ocasiones (6,17%) donde se visibilizaron menos de 20 siendo nueve especies la menor cantidad y hubo ocasiones (19,75%) con más de 50 avistamientos, siendo 59 la mayor cantidad de aves registradas en una sola visita.

Esto indica que la diversidad y frecuencia de avistamientos de aves registradas en los diferentes humedales mencionados no están relacionadas con la cantidad de superficie que abarcan, sino más bien se relaciona con las condiciones del entorno tales como la zona geográfica y el clima, además de considerar que pueden ser lugares de anidación, paso o descanso para aves migratorias.

A pesar de la riqueza de aves que existe, las amenazas como el cambio climático, introducción de especies exóticas, cambios de uso de suelo, explotación y degradación de hábitats, ponen en riesgo su permanencia en el ecosistema y por ende que exista una disminución significativa de éstas.

En virtud de los antecedentes recabados, el Parque Museo Pedro del Río Zañartu es un área que posee un alto potencial para desarrollar turismo ornitológico, considerando el alto flujo de visitantes durante todo el año. La práctica de observar y contemplar aves en su hábitat natural es una actividad que se ha desarrollado durante los últimos años con un enfoque más conservacionista y de respeto hacia los ambientes naturales. Sin embargo, para que esto suceda es necesario implementar instructivos y guías para desarrollar esta actividad sin perturbar el entorno natural de las aves.

La falta de un inventario detallado de las especies que habitan estos lugares limitaba las medidas de protección y realza la necesidad de desarrollar una guía de campo en la cual se da a conocer información relevante de cada ave registrada para facilitar el reconocimiento de éstas, además de promover la realización de actividades relacionadas con su cuidado y monitoreo.

Para que exista el desarrollo de un enfoque conservacionista y consciente, se debe realizar un trabajo integral, ya sea de los encargados del parque, como de

los visitantes, donde se incluya la comprensión de estas especies y sus hábitats, además de fomentar una participación en la preservación de la biodiversidad tanto de flora como de fauna.

Además, es importante entregar información sobre la importancia del PMPRZ en cuanto al fenómeno de migración de las aves, ya que este espacio es un lugar de descanso y alimentación para especies que recorren miles de kilómetros para cumplir sus ciclos biológicos.

Cabe destacar la avifauna presente en el PMPRZ fomenta el respeto y cuidado por el entorno natural que estas habitan, además de identificar las amenazas de estos lugares y como son afectados por cambios ya sean antrópicos o naturales, éstos por mínimos que sean tienen repercusiones en la avifauna. Igualmente tomar en cuenta que se debe ser responsable al momento de observar aves, manteniendo distancia y no interfiriendo con sus nidos y hábitats.

La información obtenida tendrá aún mayor importancia dado el constante incremento de visitantes que en los últimos años se ha extendido durante todo el año, por ello, se deberán incrementar las medidas para evitar que los visitantes causen disturbios a las aves. Por ejemplo, no autorizar el uso de cuatrimotos, kyte surf en el río Biobío y desarrollar estacionamientos bien definidos porque en la actualidad recorren cualquier área del sector de la playa e incluso la playa.

Contar con la información de una década de observación, generando datos importantes de especies, frecuencia y época de avistamientos, permite generar una Guía de Campo de Aves, lo cual sirve de insumo para generar propuestas y programas de protección y conservación de estos espacios. Lo anterior además considerando que acciones directas con la comunidad, como es el turismo ornitológico o avistamiento de aves (birdwatching), cuentan cada vez con más interesados lo que podría fomentarse mediante el cuidado de los ecosistemas donde habitan estas aves y desarrollar programas que permitan la colaboración público-privada en proyectos de conservación y protección.

V. CONCLUSIONES

El Parque Museo Pedro del Río Zañartu alberga una cantidad no menor de especies de avifauna (112 identificadas) desde endémicas, nativas e incluso introducidas, estas representan casi un 50% del total de especies de aves (226) registradas en la Región del Biobío (Cornejo y Pellet, 2021). Siendo las especies passeriformes el grupo más abundante de especies. Existe un buen balance entre especies de bosques y matorrales en comparación a especies de ambientes acuáticos, avistándose 56 especies en cada uno de ellos.

El alto número de especies presentes en el PMPRZ permite que, en general, en cada visita de observación se pueden detectar cercano a 40 especies en promedio. Esta diversidad es relevante al compararla con otros humedales del país, en especial humedales de la Región del Biobío.

En cuanto al estado de conservación, un 96,4% de las especies registradas se encuentran en categoría LC (Preocupación Menor) según la IUCN, lo cual no significa que no exista la necesidad de continuar monitoreando y protegiendo la biodiversidad presente en el parque.

VI. GLOSARIO

Aves pelágicas: Aves que pasan la mayor parte del tiempo lejos de la costa.

Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente.

Ecosistema: Sistema ecológico constituido por un medio y los seres vivos que habitan en él, así como por sus relaciones mutuas.

Especies endémicas: Especies que habitan de manera natural en un espacio determinado, ya sea un país, continente, isla u otra región con límites administrativos y geográficos.

Especies introducidas: Especie que se encuentra fuera de su área natural de distribución y cuya presencia se debe a la introducción accidental o intencional producto de la intervención humana.

Especies nativas: Corresponden a aquellas especies que viven de forma natural en un área de distribución específica, que se cree que se originaron o llegaron sin intervención humana.

Estado de conservación: Permite evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica. Medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano.

Frecuencia: Número de individuos de una especie.

Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.

Ornitología: Parte de la zoología que trata de las aves.

Riqueza de especies: Número total de especies que se encuentran en un hábitat, ecosistema, paisaje, área o región determinada.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Baquero Gómez, J. D. y Cuellar Velásquez, A. C. (2020). Reconocimiento de la importancia ecológica de las aves y su contribución al cuidado de la biodiversidad en el trapecio amazónico con estudiantes de preescolar y primero en San Antonio (Perú). *Revista Electrónica EDUCyT*, Vol. Extra, pp.367-378.

BCN (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile) (2023) decreto 28 declara santuario de la naturaleza humedal desembocadura río Biobío. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1199292>

Bevilacqua, R. (2019). *Península de Hualpén: el único santuario de la naturaleza está bajo amenaza*. <https://laderasur.com/articulo/peninsula-de-hualpen-el-unico-santuario-de-la-naturaleza-en-biobio-esta-bajo-amenaza/>

Carrasco-Lagos, P. (2004). Propuesta de manejo para la conservación del humedal Tubul Raqui, VIII Región, Chile. Tesis para optar al título profesional de Biólogo. Universidad de Concepción, Chile. 76 p

Codeff (2019). El Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén está en peligro. <https://codeff.cl/el-santuario-de-la-naturaleza-de-la-peninsula-de-hualpen-esta-en-peligro/>

Conaf (2018). Informa sobre materias vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. <https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=73505>

Conaf (2020). Listado Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. (SNASPE). https://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1610052227ListadoSNASPEActualizado21122020.pdf

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. 2020. Humedal Río Maipo. <https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/santuarios-de-la-naturaleza/humedal-rio-maipo>

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. 2024. Península de Hualpén. <https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/santuarios-de-la-naturaleza/peninsula-hualpen>

Couve, E., Vidal, C. Y Ruíz, J. (2016). *Aves de Chile. Sus islas oceánicas y Península Antártica. Una guía de campo ilustrada*. FS Editorial, Punta Arenas. 550 pp. ISBN-978-956-9824-00-5.

Convention on Biological Diversity (2020). Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. <https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf>

Del pozo, S. (2013). Historia de los Bosques Naturales y Forestal de Chile: Legislación, institucionalidad, tendencias y desafíos. ISBN-13: 979-8844044397. <https://es.slideshare.net/santiagodelpozo1/historia-de-los-bosques-naturales-y-forestal-de-chile>

Díaz, P. (2020). *La nueva oportunidad para proteger Tubul Raqui, el resiliente humedal que se recupera del terremoto y que está bajo amenaza*. <https://laderasur.com/articulo/la-nueva-oportunidad-para-proteger-tubul-raqui-el-resiliente-humedal-que-se-recupera-del-terremoto-y-que-esta-bajo-amenaza/>

Espejo, G. Y Espejo, J. (2022). Idas y venidas: Sobre la migración de las aves. <https://endemico.org/idas-y-venidas-migracion-de-aves/>

GCC Consultores (2003). Plan de manejo Santuario de la naturaleza Península de Hualpén: *Preinforme segunda etapa*. https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/ANEXO_N2-Plan-de-Manejo_SNPH.pdf

IUCN (2016). *El 15% de las tierras del planeta están protegidas, pero quedan excluidas áreas cruciales para la biodiversidad*. <https://www.iucn.org/es/news/secretariat/201609/el-15-de-las-tierras-del-planeta-est%C3%A1n-protegidas-pero-quedan-excluidas-%C3%A1reas-cruciales-para-la-biodiversidad>

IUCN (2023). Estadísticas de resumen. Tabla 3: Número de especies en cada categoría de la Lista Roja de la UICN por reino y clase. <https://www.iucnredlist.org/es/resources/summary-statistics#Summary%20Tables>

Luebert, F., Plischoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 310 p.

Martínez-Piña, D. (2023). *Aves de Chile: Guía de campo*. Museo Ediciones. Chile. 469 pp. ISBN-978-956-6266-01-3.

Martínez, D. y González, G. (2004). *Las aves de Chile* (1ª ed.). En A. Jaramillo (Ed.), *Prólogo* (pp. 8). Ediciones del Naturalista.

MMA – ONU Medio Ambiente, 2022. Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. Elaborada por Tomás A. Altamirano, consultor Proyecto GEF/SEC ID: 9766 “Conservación de humedales de la zona centro-sur de Chile” Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 98 p.

Parra, E (2014). Aves silvestres como bioindicadores de contaminación ambiental y metales pesados. https://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/2879/2177

Pellet, P y Cornejo, C. (2021). Las aves en la Región del Biobío (Chile): su riqueza, composición y distribución. Gayana, Vol. 85(1): 56 <https://www.scielo.cl/pdf/gayana/v85n1/0717-6538-gayana-85-01-55.pdf>

Peredo, R. (2007). L desembocadura del Río Lluta: Un humedal para las aves, en el desierto costero de Chile. La Chiricoca, (N° 2), 2-11.

Petit, I., Campoy A., Hevia M., Carlos Gaymer C. and Squeo F. Protected areas in Chile: are we managing them? Petit et al. Revista Chilena de Historia Natural (2018) 91:1 DOI 10.1186/s40693-018-0071-z

Pliscoff, P. (2022). Actualización de las áreas protegidas de Chile: análisis de representatividad y riesgo climático. *Centro de estudios públicos* (N° 39) https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/06/DdT_39_pliscoff-19dic.pdf

Torres, C. (2018). Elementos para el diseño de un plan de Gestión Ambiental en el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén. Habilitación Profesional, Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad de Concepción. 110 p.

Vera C., Daniela. (2017) Avifauna asociada al humedal Lenga como área de residencia y descanso para aves migratorias. Seminario de Título para optar al título de Biólogo. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.

VIII. APÉNDICE

Fichas de las 112 especies avistadas en Parque del Río Zañartu, Península de Hualpén. Basadas en la información obtenida del libro Aves de Chile, Sus Islas Oceánicas y Península Antártica escrita por Enrique Couve y Aves de Chile: Guía de campo escrita por Daniel Martínez-Piña. En esta primera etapa no se incluyeron fotos por no disponer aun de los derechos de autor de ellas, pero si el Parque Museo Pedro del Río Zañartu decide apoyar la impresión de la guía, se conseguirán las autorizaciones correspondientes.

Nombre común	Agilucho común
Nombre científico	<i>Geranoaetus polyosoma</i>
Orden	Accipitriformes
Familia	Accipitridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave rapaz con diferencia de tamaño entre el macho y la hembra siendo esta última más grande. Es de tipo polimorfo ya que pasa por diversas fases en su desarrollo. El macho adulto pasa por fase típica (clara) donde tiene un color gris en la zona superior y blanquecino oscuro en la zona inferior tornándose de un color gris ceniciento en su fase oscura. La hembra en su fase típica presenta un color similar al macho a excepción del manto que es color rufo, en su fase oscura se torna de un color negro con manto y abdomen rufo. La hembra adulta se diferencia del juvenil en fase oscura ya que este último presenta una coloración pardo negruzco.
Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas desde costa desértica, bosques, estepas, laderas de cerros y pastizales en bordes de agua.

	Se encuentra desde el extremo norte del país hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas, igualmente realiza migraciones parciales en invierno.
Hábitos	Solitario o en pareja, ocasionalmente en grupos familiares, emite fuertes sonidos en vuelo para llamar la atención de su pareja. Vuelan a gran altura planeando en círculos.

Nombre común	Bailarín
Nombre científico	<i>Elanus leucurus</i>
Orden	Accipitriformes
Familia	Accipitridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave rapaz con una ligera diferencia de tamaño entre el macho y la hembra siendo esta última de mayor tamaño. Presenta una coloración blanca a excepción del manto y alas las cuales son de un color grisáceo. Cera y patas color amarillo, iris rojo y pico color negro. Ejemplar juvenil similar al adulto, aunque presenta un tono más ocre en la corona y el iris, además de un tono anaranjado en cera y patas.
Hábitat y distribución	Reside entre pastizales, terrenos abiertos, praderas y zonas agrícolas, desde la región de Atacama hasta la Isla Grande de Chiloé.
Hábitos	Solitario, en pareja o en grupo familiar, territorial y crepuscular, caza durante el amanecer y atardecer. Vuela planeando y siempre al acecho.

Nombre común	Bailarín chico
Nombre científico	<i>Anthus correndera</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Motacillidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Se reconocen dos razas en Chile, <i>chilensis</i> : Presenta una coloración ante con estriado oscuro sobre todo en el pecho, posee dos notorias líneas longitudinales blanquecinas por la espalda, además de línea malar oscura.

	Raza <i>catamarcae</i> posee alas, patas y pico más largos, además presenta una coloración más ocre. Juvenil similar al adulto con alas de aspecto escamado.
Hábitat y distribución	Reside entre pastizales y praderas abiertas, áreas anegadas cerca de cuerpos de agua y suelos húmedos. Raza <i>chilensis</i> se encuentra desde el río Copiapó hacia el sur. La raza <i>catamarcae</i> es un residente anual del altiplano de Antofagasta y zona andina del extremo norte del país. Presente también en Islas Malvinas, Isla Mocha e Isla Santa María en la región del Biobío.
Hábitos	Solitario o en pareja, fácil de detectar cuando el macho realiza vuelo nupcial debido a fuerte y característico canto. Prefiere esconderse entre la vegetación antes que volar.

Nombre común	Bandurria
Nombre científico	<i>Theristicus melanopis</i>
Orden	Pelecaniformes
Familia	Threskiornithidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee alas gruesas, pico delgado, largo y curvo color negro. Presenta un color blanco ocráceo en la cabeza, pecho y cuello, este último con tono rufo al igual que en la corona. Partes superiores color gris con lavado café y partes inferiores color negro. Patas color rosado e iris rojo. Ejemplar juvenil similar al adulto, aunque presenta una coloración más ocrácea o canela y patas grises a rosado pálido.
Hábitat y distribución	Reside entre ambientes abiertos de matorral y estepa, además de suelos con vegetación rastrera. Con distribución segmentada en la zona norte se encuentra en la costa de Arica e islas próximas al continente, en la zona central se registra en sectores cordilleranos de Valparaíso hasta Tierra del Fuego. Parte de su población austral migra hacia Argentina durante el invierno.
Hábitos	Ave gregaria, forman colonias muy numerosas. Vuelan en manada con un aleteo suave. Terrestre, escarba y hunde su pico en el suelo para buscar

	alimento. Nidifican durante los meses de primavera y verano.
--	--

Nombre común	Becacina
Nombre científico	<i>Gallinago magellanica</i>
Orden	Charadiiformes
Familia	Scolopacidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico extremadamente largo, casi dos veces el largo de su cabeza. Patas color verdosas a amarillo oliváceo. Manto oscuro con líneas blancas. Coloración general café amarillento.
Hábitat y distribución	Reside en todo tipo de terrenos inundados, sobre todo en humedales. Se distribuye desde la región de Atacama hasta Cabo de Hornos en Magallanes, parte de la población austral migra entre junio y agosto.
Hábitos	Solitaria, en pareja o grupos dispersos. Se oculta entre la vegetación. Vuelo en zigzag. Se deja caer en picada a gran velocidad. Despliegues aéreos de cortejo durante el crepúsculo.

Nombre común	Blanquillo
Nombre científico	<i>Podiceps occipitalis</i>
Orden	Podicipediformes
Familia	Podicipedidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave zambullidora pequeña, posee un penacho auricular color amarillo dorado, aunque este cambia a un color más grisáceo en el invierno. Cabeza y partes superiores color gris pardo. Cuello y partes inferiores blancas a excepción de flancos que son color gris. Juvenil similar al adulto, pero sin penacho amarillo, el polluelo es color blanco con toques grises y oscuros en la zona superior.
Hábitat y distribución	Reside entre cuerpos de agua con o sin vegetación, humedales, bahías marinas y costas más protegidas sobre todo en invierno. Se distribuye desde la región de Atacama hasta el sur de Chiloé. En otoño sus poblaciones australes migran hacia Argentina.

Hábitos	En pareja o grupos pequeños, aunque en invierno se agrupan en bandadas con cientos de otros de su especie. Buen nadador, vuela poco. Nidifica en vegetación flotante.
----------------	---

Nombre común	Cachudito
Nombre científico	<i>Anairetes parulus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Es una de las aves más pequeñas de Chile de aspecto redondeado. Pico corto, negro y aguzado. Posee una característica cresta de plumas curvadas en la corona color negro. Partes superiores gris ahumado con tinte oliváceo. Partes inferiores color blanco con tono amarillo en el vientre. Los juveniles son similares al adulto en coloración, aunque no presentan cresta. Posee un rayado oscuro en el pecho más grueso en el macho.
Hábitat y distribución	Reside entre bosques y zonas arbustivas densas húmedas y semiáridas. También se encuentra en parques y jardines donde nidifica. Reside desde Atacama hasta Aysén; localmente se encuentra en Paposos (Antofagasta). También se distribuye hacia el norte por los Andes hasta el sur de Colombia.
Hábitos	Solitario o en parejas, pequeños grupos durante el invierno. Se desplaza entre las ramas para buscar insectos. Vuelo corto y ondulante. Se alimenta y vive entre el denso follaje.

Nombre común	Carpinterito
Nombre científico	<i>Veniliornis lignarius</i>
Orden	Piciformes
Familia	Picidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico con forma cónica color negro, patas grises. El macho presenta una mancha roja en la zona de la nuca. Frente y corona negras, lados de la cara color blanco contrastante con banda ocular y malar oscuras. Coloración general oscura con tonos

	blancos amarillentos y jaspeado negruzco en zonas inferiores. Juvenil macho con mancha roja solo en la corona.
Hábitat y distribución	Reside entre bosques forestados, abiertos y densos, además de arboleda urbana y matorral costero. Se distribuye desde La Serena hasta Punta Arenas, también se encuentra en zonas forestadas cercanas de Argentina.
Hábitos	Busca su alimento en corteza de árboles, estos pueden ser de pequeños a medianos insectos y larvas. Vuelo corto entre árboles, emite un característico llamado de alerta y su canto es áspero y agudo.

Nombre común	Cernícalo
Nombre científico	<i>Falco sparverius</i>
Orden	Falconiformes
Familia	Falconidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee alas largas y puntiagudas. Patas amarillas. Pico gris azulado con punta negra. Esta especie presenta dimorfismo sexual, a pesar de esto ambos presentan corona gris con tonos rufo y dos líneas negras en la cara, además de cola recta en forma de abanico. El macho presenta partes superiores color canela. Alas gris azulado. Partes inferiores blancas ocre con manchas negras hacia la parte baja del pecho. Cola rojiza con ancha banda color negro y punta blanca. La hembra presenta partes inferiores blancas con jaspeado canela en el pecho. Alas canela con barrido oscuro. Cola rojiza con numerosas bandas negras. Ejemplar juvenil presenta tonos más apagados siendo la zona baja de un color ocre claro y el dorso oscuro canela.
Hábitat y distribución	Reside en terrenos abiertos con puntos altos donde puede acechar a sus presas, también en ambientes precordilleranos y costa marina. Presenta tres razas, <i>cinnamominus</i> común para gran parte de Chile, <i>peruvianus</i> zona de prepuna al norte del río Loa y <i>fernandensis</i> la cual se encuentra solo en el Archipiélago Juan Fernandez.

Hábitos	Solitario. Tiene un vuelo rectilíneo intercalando aleteos rápidos con breves planeos a baja altura, acechando mientras vuela.
----------------	---

Nombre común	Chercán
Nombre científico	<i>Troglodytes aedon</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Troglodytidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Se reconocen tres razas en Chile. Raza <i>chilensis</i> , presenta pico fino y recto con mandíbula color cuerno. Presenta un anillo orbital color blanco. Partes superiores color canela con lavado grisáceo. Partes inferiores color ante. Alas y cola color canela y fino barrado café oscuro. La raza <i>atacamensis</i> , posee coloración más pálida y el pico ligeramente más largo y delgado. La raza <i>tecellatus</i> posee una coloración más grisácea y pálida.
Hábitat y distribución	Asociado a vegetación arbustiva y bosques, estepas, dunas, zonas semiáridas y húmedas. La raza <i>chilensis</i> se distribuye desde Atacama hasta Cabo de Hornos, <i>atacamensis</i> desde Tarapacá hasta Coquimbo y <i>tecellatus</i> reside valles y oasis cercanos a Arica.
Hábitos	Solitario o en parejas. Ágil y rápido. Vuela a baja altura y distancias cortas. Nidifica con frecuencia en construcciones humanas y en todo tipo de agujeros. Vive entre el follaje de árboles y matorrales.

Nombre común	Chercán de las vegas
Nombre científico	<i>Cistothorus platensis</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Troglodytidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Zona superior del cuerpo color pardo oscuro con estriado blanco y negro, siendo más notorio en el manto. Cola y alas canela con gruesas líneas negras. Partes inferiores blancas con tonos pardo y ocre en rabadilla y flancos. Pico fino y recto color pardo con mandíbula amarillenta anaranjada.

Hábitat y distribución	Reside entre pajonales y áreas de matorral cercanas a cuerpos de agua, humedales con totoras y juncos. Se distribuye desde el valle de Huasco en la región de Atacama hasta Cabo de Hornos, también ha sido avistado en la Isla Mocha e Isla Santa María.
Hábitos	Solitario o en pareja. Difícil de observar ya que se esconde entre la vegetación. Vuelo corto y bajo sobre la vegetación. Durante la reproducción acostumbra a cantar desde la altura. Canto con nota repetitiva seguida de un largo trino.

Nombre común	Chincol
Nombre científico	<i>Zonotrichia capensis chilensis</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Emberizidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color gris y patas rosadas. Presenta forma cónica en la cabeza debido a la cresta que posee. Presenta coloración gris en la cabeza con dos líneas negras en la corona. Partes superiores gris con un tono canela hacia flancos. Presenta un collar posterior al cuello color rufo y manto pardo con líneas oscuras. Alas negras con borde ante. Partes inferiores blancas con lavado gris en el pecho. El ejemplar juvenil presenta un color pardo grisáceo con estriado negro en cabeza y cuerpo, además no presenta collar posterior rufo a diferencia del adulto.
Hábitat y distribución	Reside en todo tipo de ambientes, además de ciudades, pueblos y zonas agrícolas. Se distribuye desde Arica a Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez.
Hábitos	En pareja, aunque en ocasiones llegan a formar bandadas con gran número de individuos. Canto característico sin embargo es variable entre las distintas razas. Se mueve dando pequeños saltos. Se alimenta de semillas e insectos.

Nombre común	Chirihue
Nombre científico	<i>Sicalis luteola</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Thraupidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color gris, corto y con forma cónica, sus patas son de color gris rosáceo. La hembra y el macho se diferencian por su coloración, el macho es amarillo con un tono pardo en la corona, en cambio la hembra es color amarillo oliva tono blanco amarillento en las partes inferiores.
Hábitat y distribución	Reside entre zonas bajas y costeras, campos, áreas de cultivo y prados cercanos a cuerpos de agua, también en zonas urbanas. Se distribuye desde Antofagasta hasta Aysén, los grupos australes migran por la costa hacia el norte en invierno.
Hábitos	Pequeños grupos o bandadas, busca su alimento en el suelo, vuelo nupcial en época de cortejo, trino con notas agudas y descendentes.

Nombre común	Chorlo chileno
Nombre científico	<i>Charadrius modestus</i>
Orden	Charadiiformes
Familia	Charadriidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee una gran cabeza con cuello corto, pico color negro, agudo y corto. Patas color rosado pálido con toque gris, aunque algunos pueden presentar patas color amarillo. Dos tipos de plumaje; reproductivo: Cara gris con línea blanca en la frente, resto de partes superiores color café con un toque gris oscuro, pecho rufo con banda negra en la zona pectoral. En la época no reproductiva la línea blanca en su frente se vuelve opaca, pierde el color del pecho y la banda en zona pectoral se vuelve café oscuro. El ejemplar juvenil presenta coloración similar al adulto, aunque sin banda en zona pectoral y patas verdosas.
Hábitat y distribución	Preferencia por playas marinas con alta pedregosidad, hacia el interior se encuentra en zonas de matorral, praderas y terrenos cercanos a humedales costeros. Se distribuye desde Los Lagos

	hasta Cabo de Hornos. Si bien una parte de su población magellanica migra hacia la zona norte en época invernal otra gran parte se queda en la región austral. Igualmente reside en Islas Malvinas.
Hábitos	Solitario, en pareja o bandada durante la época sin crías. Emite un pitido corto y repetitivo durante el vuelo. Nidifica en ambientes de altura, aunque entre matorrales bajos entre octubre y febrero.

Nombre común	Chorlo de collar
Nombre científico	<i>Charadrius collaris</i>
Orden	Charadiiformes
Familia	Charadriidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave con gran cabeza, cuello corto y patas largas color rosado pálido. Pico delgado color negro, aunque algunos ejemplares presentan pico color cuerno con punta negra. Presenta una mancha en la corona y en el cuello a semejanza de collar color negro de variable intensidad, el resto de la cara es color blanco. Partes superiores, alas y cola son de color café grisáceo. La nuca y zona posterior de la corona presentan desde un color café claro a un café grisáceo.
Hábitat y distribución	Reside en playas con abundante arena, desembocaduras y llanos, zonas intermareales fangosas y estuarios. Se distribuye desde Atacama hasta Chiloé, además de ser abundante en la costa central de Chile. Se dispersa hacia el norte por gran parte del oriente de Sudamérica hasta México.
Hábitos	Solitario, en pareja o bandada durante época de crías. Silencioso, emite un sonido aislado.

Nombre común	Chorlo de doble collar
Nombre científico	<i>Charadrius falklandicus</i>
Orden	Charadiiformes
Familia	Charadriidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave que posee pico negro, delgado y agudo, además de patas color gris oscuro. Dos tipos de plumaje;

	reproductivo: Presenta una fina línea color negro sobre la frente, la cual continúa hacia la zona auricular. Partes superiores, alas y cola color pardo grisáceo. Zona de la nuca, corona y lados del cuello son color acanelado. Frente, cara y partes inferiores son color blanco. Posee dos collares sobre el pecho color negro. El plumaje durante la época no reproductiva cambia, pierden su tono canela en la cabeza y cuello, además los dos collares se vuelven de un color más tenue y pueden estar incompletos.
Hábitat y distribución	Reside en costas marinas, playas arenosas, desembocaduras y orillas de lagunas tanto de agua salada como agua dulce. Comúnmente se encuentra en zona costera e interior de la vertiente oriental de Aysén y Magallanes. Igualmente migra desde Chiloé hasta Valparaíso llegando hasta Caldera. Parte de su población se encuentra en las costas marinas de la zona austral durante el invierno. También reside en Islas Malvinas.
Hábitos	En pareja o grupos durante época de crías, aunque se unen en grandes bandadas antes de migrar. Emite silbido al volar. Camina rápido y se alimenta en costas marinas o bordes de lagunas.

Nombre común	Chuncho común
Nombre científico	<i>Glaucidium nana</i>
Orden	Strigiformes
Familia	Strigidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Búho pequeño, pico curvo con cera amarilla al igual que el iris. Patas amarillas y emplumadas hasta la base. Posee cejas color blanco en forma de medialuna. Corona y nuca café con tonos grises y notorias pecas color blanco. Partes superiores y dorso del ala color café con tonos grises y motas blancas en escápulas y parte superior alar. Presenta cola corta color café grisáceo. Partes inferiores color café con estriado longitudinal blanco, aunque esto último varía dependiendo el individuo.
Hábitat y distribución	Reside entre bosques abiertos con cobertura densa o dispersa, parques y renovales con zona arbustiva

	alta. Se distribuye por zonas boscosas desde Huasco hasta la zona sur de Tierra del Fuego. Igualmente se desplaza por zonas forestadas cercanas desde Neuquén (Argentina) hacía el sur.
Hábitos	Solitario, pareja o pequeños grupos, aunque es más de hábitos nocturnos también es activo durante el día. Silbidos monótonos y repetitivos. Acecha a sus presas desde la altura y se alimenta de mamíferos y aves pequeñas.

Nombre común	Churrete
Nombre científico	<i>Cinclodes patagonicus chilensis</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Dos razas reconocidas en Chile; nominal: Presenta pico largo color negro y patas del mismo tono. Coloración general pardo oscuro ahumado en partes superiores y de un tono más grisáceo en partes inferiores con un jaspeado blanco en pecho y abdomen. Posee una línea blanca superciliar, además de la garganta y lados del cuello en el mismo tono. Cola café con tonos negros. Raza <i>chilensis</i> en sus partes superiores posee una coloración en tono rufo, además el jaspeado blanco del pecho solo se observa en el cuello.
Hábitat y distribución	Reside en todo tipo de ambientes cercanos a cuerpos de agua y orillas del litoral marino, además de zonas cordilleranas y valles interiores. La raza nominal se distribuye por zonas costeras desde Cabo de Hornos hasta la región de Aysén, en cambio <i>chilensis</i> se encuentra desde el norte de Aysén hasta Atacama.
Hábitos	Solitario, pareja o grupos dispersos pequeños. Durante su época reproductiva emite un trino bastante ruidoso. Terrestre, pero se posa en ramas bajas de vegetación. Consume preferentemente insectos, invertebrados pequeños e incluso peces.

Nombre común	Churrete acanelado
Nombre científico	<i>Cinclodes fuscus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico y patas color negro pálido. Coloración parda ahumado en partes superiores y presenta un color blanco acanelado en partes inferiores. Presenta línea superciliar ante. Cola café con tonos negros, bordes y punta de esta color ante. En el pecho posee un color pardo canela con escamado blanco. Las alas poseen una notoria banda color ocre.
Hábitat y distribución	Reside en ambientes precordilleranos, matorral preandino, estepa en altura, zonas de ladera, valles cercanos a humedales, cursos de agua o borde marino. Se distribuye desde Atacama a Cabo de Hornos, aunque en invierno migra por la costa hasta el sur de Antofagasta.
Hábitos	Solitario, parejas o grupos dispersos. Es más bien terrestre, aunque se puede ver posado sobre matorrales. En época reproductiva emite un sonoro y prolongado trino mientras levanta la cabeza y agita sus alas.

Nombre común	Churrete costero
Nombre científico	<i>Cinclodes nigrofumosus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave de gran tamaño, la cual posee pico color negro, de aspecto recto y puntiagudo, patas largas en color oscuro. Presenta un color pardo ahumado oscuro en gran parte de su cuerpo, además de una fina línea superciliar en tono ocre. Parte superior de zona abdominal y pecho presentan un jaspeado blanco regular. Posee una mancha color blanco en el mentón. Presenta una banda color ocre en las alas.
Hábitat y distribución	Habitante común de zona intermareal rocosa, también playas arenosas y desembocaduras de ríos y riachuelos.

	Se distribuye por la zona litoral desde el sur de Arica hasta el sur de la Araucanía, igualmente se encuentra en Isla Mocha en el Biobío. Es endémica de Chile.
Hábitos	Solitario, pareja o familias. Se alimenta en la costa rocosa capturando pequeños invertebrados marinos varados en algas o playas. Emite fuertes sonidos y aleteos posado sobre rocas. Nidifica en zonas rocosas cercanas al agua o construcciones cercanas.

Nombre común	Churrín de la mocha
Nombre científico	<i>Eugralla paradoxa</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Rhynocriptidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	De cabeza cónica, pico color negro y patas amarillentas. Posee dedos y uñas muy largas. Color general gris pizarra, con parte baja del abdomen en tonos canela, alas y cola color negro. Los ejemplares juveniles poseen partes superiores color pardo oscuro e inferiores color canela con pico y patas color cuerno.
Hábitat y distribución	Reside en bosques templados húmedos de <i>Nothofagus</i> y sotobosque arbustivo denso compuesto principalmente por quila (<i>Chusquea</i>). Se distribuye desde la región del Maule hasta la zona norte de Aysén, se incluye también la isla Santa María e Isla Mocha en la región del Biobío. Igualmente se encuentra en zonas boscosas andinas argentinas.
Hábitos	Solitario, pareja o pequeños grupos. Ave más bien terrestre, se esconde entre la vegetación y escarba ruidosamente para buscar alimento. Emite una nota monótona y repetitiva.

Nombre común	Churrín del norte
Nombre científico	<i>Scytalopus fuscus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Rhynocriptidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor

Identificación	Posee pico color negro y aspecto fino, patas rosadas a tonos negros con toques rojizos. Presentan una coloración general gris a negro azabache, con frente y lorums aún más oscuros. Ejemplares juveniles son color café grisáceo con ligero lavado negro.
Hábitat y distribución	Reside entre matorral denso, quebradas rocosas con presencia de cactus y <i>Puya</i> , bosque esclerófilo y cursos de agua. Se distribuye desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía pasando por el río Biobío y Nahuelbuta. Es endémico de Chile.
Hábitos	Solitario o en pareja, trino repetitivo y audible a la distancia. Escarba el suelo en busca de alimento.

Nombre común	Churrín del sur
Nombre científico	<i>Scytalopus magellanicus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Rhynocriptidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color negro y de aspecto fino, patas entre rosado oscuro y negro. Coloración general gris pizarra. Algunos individuos presentan un parche color blanco en la corona. Los ejemplares de zonas andinas son de un color más oscuro sin mancha clara en la nuca, los juveniles son color pardo oscuro con escamado acanelado, además el pico y patas son color cuerno.
Hábitat y distribución	Reside en bosques templados húmedo, sotobosque y zonas arbustivas densas con claros de bosque, cercano a cursos de agua. En la zona de archipiélago se encuentra entre bosques de <i>Nothofagus antarctica</i> , en Los Andes centrales habita áreas de roqueríos cercanos a cuerpos de agua. Se distribuye por zonas cordilleranas desde la región de Valparaíso hacia el sur hasta Magallanes.
Hábitos	Solitario, pareja o pequeños grupos, canto sonoro y repetitivo. Terrestre pero siempre con la cola hacia arriba. Escarba el suelo en busca de alimento.

Nombre común	Cisne coscoroba
Nombre científico	<i>Coscoroba coscoroba</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Cisne de gran tamaño con un pico color rojo distintivo, patas e iris del ojo en color rosado. Presenta un color blanco por todo el cuerpo, solo las alas primarias presentan un color negro en la punta. Ejemplar juvenil posee corona negra y un color blanco sucio además del color gris a rojizo en el pico.
Hábitat y distribución	Reside en humedales, lagos y lagunas de poca profundidad, pueden ser de agua dulce o salada y puede presentar o no vegetación en las orillas. Se distribuye desde Coquimbo hasta Cabo de Hornos, aunque nidifica en la vertiente oriental de Los Andes en época estival. Se encuentra también en zonas bajas de Argentina, Paraguay y sureste de Brasil.
Hábitos	Generalmente en parejas, aunque se reúnen en grupos en época de crías. Se alimenta pastoreando en las orillas de cuerpos de agua y toma descansos en tierra. Posee un característico sonido.

Nombre común	Cisne cuello negro
Nombre científico	<i>Cygnus melancoryphus</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Cisne grande de pico largo color gris azulado con vistosa carúncula nasal roja y patas rosadas. Posee línea superciliar blanca la cual, en algunos ejemplares se extiende hasta la nuca. Cabeza y cuello negros, resto del cuerpo color blanco. Ejemplar juvenil presenta un color general blanco con toques café, pequeña carúncula en tono anaranjado.
Hábitat y distribución	Reside en lagos y humedales bajos, costa marina en sitios de estuario o canales.

	Se distribuye desde Coquimbo a Cabo de Hornos y Canal Beagle en la región de Magallanes, también en isla Santa María e isla Mocha en el Biobío. Igualmente se encuentra en zonas bajas de Argentina, Paraguay, sureste de Brasil e Islas Malvinas.
Hábitos	Acuático, nidifica entre los meses de primavera y verano entre pajonales o vegetación. Se alimenta de algas y plantas acuáticas. Los polluelos suelen montar el lomo de los padres para descansar o protegerse de amenazas. Vuelo pesado, rápido y bullicioso.

Nombre común	Codorniz
Nombre científico	<i>Callipepla californica</i>
Orden	Galliformes
Familia	Odontophoridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico negro y patas grises. Presenta dimorfismo sexual. Macho: Cara color con negro con marcada línea superciliar color blanco en la frente, además de un copete de plumas color negro. Cuello y pecho gris pizarra, partes superiores en tonos café con gris. Hembra: Cara color café con tono gris, el copete es más corto además la línea superciliar es de un blanco más tenue.
Hábitat y distribución	Reside en quebradas semiáridas y ambientes rocosos con matorral disperso. En la zona sur se encuentran en bosques abiertos cercanos a caminos y senderos. Se distribuye desde Coquimbo a Los Lagos por zonas de precordillera baja. Zona costera y cordillerana desde Atacama hasta Tarapacá. Introducida en Chile, originaria de Estados Unidos.
Hábitos	Desde pequeñas a grandes bandadas. Prefieren correr antes que volar. Se alimentan en terrenos expuestos y transitan en fila. Emite un sonido similar al cacareo cuando se encuentra entre la vegetación.

Nombre común	Colegial
Nombre científico	<i>Lessonia rufa</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico agudo, patas en el mismo color. Presenta dimorfismo sexual. Macho: Presenta color negro en todo el cuerpo, excepto por un parche color castaño que se extiende por el manto y escapulas. Hembra: Coloración pardo con un tono acanelado en el manto y alas más oscuras que el resto del cuerpo. Las colas de ambos sexos son contrastantes entre sí. Juvenil: Presenta coloración similar a la hembra, aunque su línea superciliar es más pálida. Partes inferiores café grisáceo con estriado blanquecino en el pecho.
Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas cercanas a cuerpos de agua, ya sean lagunas, costas marinas, etc. Se distribuye desde el norte chico hasta Los Lagos. Durante el invierno las poblaciones australes de la Patagonia y Magallanes migran por la costa hacia la zona norte. Igualmente se encuentra en el sur de Argentina y en época migratoria alcanza el oeste y sur de Bolivia, Paraguay y sur de Brasil.
Hábitos	Parejas o grupos pequeños. Preferentemente le gusta estar en tierra, pero se posa sobre pequeños arbustos o alambradas. Vuela a baja altura y corre rápido.

Nombre común	Colilarga
Nombre científico	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Su única cola alcanza el doble de largo que su cuerpo. Pico recto, fino y alargado color negro, aunque por debajo (zona mandibular) es color amarillo. De color canela ocráceo con frente y corona en tonos rufo. Su cola es delgada y posee seis plumas siendo las dos del medio más largas, el par que sigue mide la mitad de las centrales y las dos más externas son muy reducidas. Ejemplares juveniles

	similares al adulto, aunque sin el tono rufo de frente y corona.
Hábitat y distribución	Reside en el bosque valdiviano, sotobosque denso con abundante quila (<i>Chusquea</i>), quebradas, zarzas y matorrales cercanos a zonas abiertas. Se distribuye desde Coquimbo a Magallanes por zonas boscosas de los canales patagónicos. Igualmente se encuentra en la zona sur de Argentina.
Hábitos	En pareja, se esconde entre la densa vegetación, trino repetitivo y fuerte cuando se siente amenazado.

Nombre común	Comesebo grande
Nombre científico	<i>Pygarrhichas albogularis</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave trepadora arborícola. Gran cabeza, pico largo levemente curvado hacia arriba color oscuro con mandíbula en tono marfil. Partes superiores pardo oscuro a excepción del lomo que tiene tinte rufo o rojizo al igual que la cola. Pecho y garganta blancos al igual que el abdomen y subcaudales, aunque estos últimos presentan escamado oscuro. Juvenil: Similar al macho, aunque las partes superiores presentan leves toques blancos.
Hábitat y distribución	Reside en bosques, árboles nativos altos y viejos como <i>Nothofagus</i> . Bosque esclerófilo y plantación. Se distribuye por zonas boscosas de Tierra del Fuego hasta Coquimbo. Igualmente se encuentra en bosques al sureste de Argentina.
Hábitos	Solitario, pareja o grupos pequeños, puede formar bandadas con Rayaditos. Se alimenta en troncos y ramas trepando en sentido vertical con sus patas y cola. Golpetea troncos, similar al carpinterito.

Nombre común	Cometocino patagónico
Nombre científico	<i>Phrygilus patagonicus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Thraupidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico color gris pálido, patas rosadas e iris rojizo. Presenta dimorfismo sexual. Macho: Cabeza gris pizarra contrastante con su manto castaño y pecho amarillo. Cola color negro, todas las plumas poseen borde gris perla. Subcaudales blancas. Hembra: Similar al macho con una coloración más opaca y manto de un tono amarillo oliváceo.
Hábitat y distribución	Reside en bosques de gran altura con claros y matorral contiguo, bosque austral y esclerófilo. Puede ser avistado en parques y zonas urbanas. Se distribuye desde Cabo de Hornos hacia la precordillera del Maule, durante el invierno migra hacia Valparaíso por la zona costera. Igualmente se encuentra en zonas cercanas por el sureste de Argentina.
Hábitos	Pareja o pequeñas bandadas, ya sean mixtas con otras aves o su misma especie. Se alimenta en zonas altas o medias del follaje. Trino largo y melodioso.

Nombre común	Cuervo de pantano común
Nombre científico	<i>Plegadis chihi</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Threskiornithidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico delgado con forma curva color gris con tonos rosados y patas que van desde un color rojizo a negro. Cuerpo, cabeza y cuello color pardo manchado de puntos blancos. Las alas, cola y parte del manto son color verde tornasol. Posee una línea blanca que va desde la frente hasta el mentón pasando tras los ojos. Piel descubierta color rosado en la zona del pico. Plumaje reproductivo: Cabeza y cuello se tornan color café oscuro y el cinto blanco alrededor de la cara es más notorio. Las alas son café con tonos

	verde metálico. Juvenil: Similar al adulto con plumaje en reposo, aunque con un color ahumado en el cuerpo y alas con un brillo verde.
Hábitat y distribución	Reside en humedales con vegetación ribereña como totoras y humedales costeros. Se distribuye desde Huasco en Atacama desplazándose por la costa hasta Valparaíso. Más al sur se distribuye hasta la región de Los Lagos. Se desplaza por el centro de Argentina hasta Brasil, llegando a México y Estados Unidos.
Hábitos	Nidifica entre los meses de noviembre y diciembre entre juncos junto a otras aves, ya sea de su colonia u otra. Vuelan en bandada en forma de “v”, también se mueven en grupo hacia sus dormitorios. Busca su comida en el agua hundiendo el pico.

Nombre común	Cuervo de pantano común
Nombre científico	<i>Plegadis chihi</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Threskiornithidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico delgado con forma curva color gris con tonos rosados y patas que van desde un color rojizo a negro. Cuerpo, cabeza y cuello color pardo manchado de puntos blancos. Las alas, cola y parte del manto son color verde tornasol. Posee una línea blanca que va desde la frente hasta el mentón pasando tras los ojos. Piel descubierta color rosado en la zona del pico. Plumaje reproductivo: Cabeza y cuello se tornan color café oscuro y el cinto blanco alrededor de la cara es más notorio. Las alas son café con tonos verde metálico. Juvenil: Similar al adulto con plumaje en reposo, aunque con un color ahumado en el cuerpo y alas con un brillo verde.
Hábitat y distribución	Reside en humedales con vegetación ribereña como totoras y humedales costeros. Se distribuye desde Huasco en Atacama desplazándose por la costa hasta Valparaíso. Más al sur se distribuye hasta la región de Los Lagos. Se desplaza por el centro de Argentina hasta Brasil, llegando a México y Estados Unidos.

Hábitos	Nidifica entre los meses de noviembre y diciembre entre juncos junto a otras aves, ya sea de su colonia u otra. Vuelan en bandada en forma de “v”, también se mueven en grupo hacia sus dormitorios. Busca su comida en el agua hundiendo el pico.
----------------	--

Nombre común	Dormilona tontita
Nombre científico	<i>Muscisaxicola macloviana</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico y patas negras, estas últimas muy largas, zona periocular oscura a modo de antifaz. Posee un color castaño oscuro en la corona y barbilla. Zona superior color pardo grisáceo y en zona inferior presenta un tono blanco sucio, además de alas café ahumado. Ejemplar juvenil es de tono más pálido, posee pequeñas plumas alares con bordes ocre y un fino estriado en la zona inferior del cuerpo.
Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas e interiores, además en invierno prefiere campos de cultivo y costa marina. Realiza migración estacional en la zona central del país, aunque en invierno migra hacia el norte por la zona costera.
Hábitos	Solitaria, parejas o grupos pequeños, aunque se junta en bandada al momento de migrar, estas son dispersas. Come insectos y pequeños invertebrados.

Nombre común	Fio Fio
Nombre científico	<i>Elaenia albiceps</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico corto color gris con la zona mandibular rosado pálido a amarillo. Presenta una cresta eréctil en “v” y un color blanco en la zona central de la corona. Coloración gris oliva con banda alar gris blanquecino. Juvenil similar al adulto, pero de coloración más opaca, corona sin color blanco.
Hábitat y distribución	Reside en zonas de vegetación arbustiva, bosques, cercano a urbes, parques, jardines.

	Especie migratoria . Desde Atacama hasta Tierra del Fuego incluyendo Cabo de Hornos durante los meses de octubre y marzo. Durante la época invernal alcanza la amazonia de Perú y Brasil.
Hábitos	Solitario, pareja o pequeños grupos. Vive y consigue su alimento en el follaje de los árboles. Es omnívoro ya que, se alimenta de insectos, frutos y semillas, además también ha sido captado extrayendo néctar de las flores. Característico, bullicioso y monótono silbido.

Nombre común	Gallina ciega
Nombre científico	<i>Systellura longirostris</i>
Orden	Caprimulgiformes
Familia	Caprimulgidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Raza <i>bifasciatus</i> , posee una coloración en colores oscuros de gris, pardo y ocre. Presenta un parche negro y alargado en el centro de la corona, mancha en forma de collar no muy notorio color ocre o blanquecino. Se observa un parche blanco en el centro de las alas primarias, en la hembra este parche es en tono ocre. La cola del macho posee un color blanco en la punta de las plumas externas.
Hábitat y distribución	Reside en gran variedad de ambientes abiertos, zonas áridas, laderas de cordillera y vegetación dispersa. Se distribuye en gran parte del país por zonas bajas y precordilleranas desde Antofagasta a Aysén.
Hábitos	Solitaria o pareja, de hábitos nocturnos. Captura insectos en vuelo. Descansa escondida entre la vegetación durante el día. Emprende vuelo bajo y corto en forma de zigzag ante amenazas.

Nombre común	Garza boyera
Nombre científico	<i>Bubulcus ibis</i>
Orden	Pelecaniformes
Familia	Ardeidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	De cuello corto y de aspecto grueso, pico agudo y corto color amarillo. Patas e iris naranja. Presenta una cresta eréctil en la corona. De color blanco anaranjado amarillento en pecho, corona y dorso. Plumaje de reposo: Coloración completamente blanca, pico, patas e iris en colores amarillo. Ejemplar juvenil presenta pico y patas en tonos grises, verdes o amarillos.
Hábitat y distribución	Reside en zonas costeras y bajas de interior, praderas, áreas de cultivo y arado, pastizales con ganado. Se distribuye por gran parte de Chile, pero nidifica entre Coquimbo y la región del Maule.
Hábitos	Viven en comunidad y nidifican en colonias dispersas, ya sea en zonas de pajonal o copas de árboles durante primavera y verano. Se alimenta en cercanía de rebaños.

Nombre común	Garza chica
Nombre científico	<i>Egretta thula</i>
Orden	Pelecaniformes
Familia	Ardeidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un largo cuello y un pico fino y aguzado en color negro. Patas largas y negras con dedos y parte posterior amarilla. Posee anillo orbital amarillo. Extensa cresta nuchal, aunque no siempre se observa. Coloración blanca con largas plumas en zona pectoral. Ejemplar juvenil posee patas amarillas verdosas, además no presenta cresta nuchal.
Hábitat y distribución	Reside en humedales, ya sean de agua dulce o salada. Orillas de lagos y lagunas, además de la costa marina y lagos andinos. Se distribuye por gran parte del país, aunque es inusual verla desde Aysén hacia el sur.

Hábitos	Viven en comunidad, descansa o caza en grupos pequeños, en época reproductiva se junta en colonias junto a otras garzas. Nidifica en zonas bajas entre el follaje de árboles, preferentemente en zonas con agua durante la época estival. Vuela a gran altura de forma grupal, en formación o en línea.
----------------	---

Nombre común	Garza cuca
Nombre científico	<i>Ardea cocoi</i>
Orden	Pelecaniformes
Familia	Ardeidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Garza de mayor tamaño de color gris con manto blanco y cuello largo con dos líneas color negro. Patas largas color amarillo al igual que el iris. Largo pico color amarillo anaranjado. Presenta una capucha negra en la cabeza y dos plumas que salen desde la nuca en el mismo color. Pecho blanco con plumas alargadas y abdomen negro. Ejemplar juvenil presenta un color gris amarillento en el pico, capucha sin plumas y es de una coloración más sucia o grisácea.
Hábitat y distribución	Reside en humedales tanto dulces como salados. Orillas de lagos, lagunas y costa marina. Se distribuye desde Copiapó hacia el sur. Ocasionalmente por el norte desde Arica hacia la cordillera.
Hábitos	Solitaria. Posada en orillas de cuerpos de agua, inmóvil y concentrada a la hora de cazar. Vuelo sostenido a un ritmo lento y elegante. Nidifica entre primavera y verano en partes altas de árboles que están sumergidos.

Nombre común	Garza grande
Nombre científico	<i>Ardea alba</i>
Orden	Pelecaniformes
Familia	Ardeidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Garza de cuerpo estilizado pico largo con forma aguda en color amarillo. Patas color negro e iris amarillo al igual que el anillo orbital. En época

	reproductiva el lorums se vuelve verdoso y el pico se torna de un amarillo más oscuro. Coloración blanca con plumas largas en manto y pecho.
Hábitat y distribución	Reside en aguas de baja profundidad, ríos tranquilos, planicies intermareales y costa marina. Se distribuye por gran parte del país, desde la zona norte hasta Aysén. Es visitante estival de humedales altiplánicos de Antofagasta.
Hábitos	Solitaria, pareja o grupos pequeños que incluyen otras especies como garza chica. En época reproductiva viven en colonias. Nidifica sobre árboles y arbustos de zonas con agua durante época estival.

Nombre común	Gaviota cáhuil
Nombre científico	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Laridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Dos tipos de plumaje; reproductivo: Color pardo en la cabeza. Zona inferior, pecho, cuello y cola blancos. Partes superiores, manto y dorso alar son color gris perla. Pico y patas color rojo. Plumaje no reproductivo: Pico y patas en tonos naranja. Coloración blanca con manto y alas en color gris claro, también posee una mancha oscura en la aurícula. Ejemplar juvenil: Similar al adulto en su primera etapa, aunque carece de capucha, posee plumas pardas en corona y manto. A medida que crece la corona, manto y alas se tornan de un pardo más oscuro.
Hábitat y distribución	Cuerpos de agua, costas marinas, ríos y lagos. Se distribuye desde Coquimbo hasta Cabo de Hornos en Magallanes. Igualmente, parte de su población migra durante el invierno por la costa hacia la zona norte del país.
Hábitos	En bandadas. Nidifica en colonias, en zonas bajas de lagunas con abundante pajonal en las orillas.

Nombre común	Gaviota dominicana
Nombre científico	<i>Larus Dominicanus</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Laridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Adulto: Coloración blanca con manto y alas color negro, pico amarillo con mancha roja en la mandíbula, patas verdosas e iris rojizo. La cola es color blanco, al igual que el margen de las alas. Inmaduro: Pico color amarillo con punta negra. Iris oscuro. Cola color blanco con punta negra. Juvenil: Pico color negro, patas verdosas con toque gris. Iris oscuro. Coloración parda con un tono pálido en las puntas de plumas. Cola negra y alas con aspecto escamado.
Hábitat	Reside en costas y canales marinos, humedales, lagos y ríos además de zonas agrícolas. Residente de toda la costa chilena desde Atacama hasta Magallanes, ocasional es Juan Fernández e Isla de Pascua. Igualmente se encuentra en Ecuador y Brasil.
Hábitos	Bandadas numerosas, agresiva a la hora de disputar comida. Roba alimento y crías de otras especies. Carroñera. Asociada a sectores de basura y desechos. Se alimenta de moluscos en la costa.

Nombre común	Gaviota de Franklin
Nombre científico	<i>Leucophaeus pipixcan</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Laridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Plumaje no reproductivo: Cabeza color blanco con tonos negros en nuca, corona y aurícula, lo cual contrasta con el anillo orbital color blanco. Zona inferior en color blanco al igual que la cola. Manto y alas color gris. Pico negro y patas rojas. Plumaje reproductivo: Pico en tonos rojizos y patas negras. Cabeza completa color negro con ancho anillo orbital color blanco. Igualmente puede o no presentar un tono rosado en la zona inferior del cuerpo.

	Inmaduro: Alas con plumas color pardo con centro oscuro, de patas rojas y pico oscuro. Cola blanca con notoria banda oscura en zona terminal. Cabeza blanca con tonos negros.
Hábitat y distribución	Reside en zonas costeras marinas y humedales de interior. Se distribuye desde Arica hasta la región de Los Lagos. Es una especie migratoria, la cual llega a las costas chilenas en época de verano.
Hábitos	Forma bandadas que pueden llegar a estar compuestas por miles de individuos. En la zona sur se encuentra en grupos pequeños o solitaria, también se puede asociar a otras especies de gaviotas. Se alimenta en playas arenosas.

Nombre común	Gaviota garuma
Nombre científico	<i>Leucophaeus modestus</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Laridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Pico color negro, largo y puntiagudo, al igual que las patas e iris, esto en todas sus fases. Plumaje reproductivo: Cabeza blanca con cuerpo color gris perla. Cola gris con ancha banda terminal negra con borde blanco. Plumaje no reproductivo: Cabeza color pardo con el resto del cuerpo gris. Juvenil: Coloración pardo grisáceo, siendo de un tono más pálido en el manto y alas, además presenta escamas blancas en todas las plumas.
Hábitat y distribución	Reside exclusivamente en zonas costeras, habita playas arenosas y roqueríos. Se distribuye desde el extremo norte hasta el Biobío, ocasionalmente llega hasta la región de Los Lagos y Chiloé. Nidifica en colonias ubicadas en el desierto de Atacama. Es una especie endémica de la corriente de Humboldt.
Hábitos	Usualmente se reúnen en numerosas bandadas, incluso se asocian a otras especies playeras. Activa al caer la noche. Se alimenta en zonas arenosas de

	playas donde busca camarones. Nidifica en llanos desérticos en colonias llamadas “garumales”.
--	---

Nombre común	Gaviotín elegante
Nombre científico	<i>Thalasseus elegans</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Laridae
Estado de conservación	NT, casi amenazado
Identificación	Plumaje no reproductivo: El pico va desde un color amarillo a un tono anaranjado, largo y puntiagudo. Patas negras Cabeza blanca con un parche negro desde la nuca hasta el ojo, la cual se observa como una pequeña cresta. Dorso superior del ala y resto de zona superior gris perla con zona inferior blanca. Plumaje reproductivo: El pico va desde un color rojo hasta un naranja. Cabeza completamente negra. Zona inferior del cuerpo color blanco con tonos rosados. Inmaduro: Similar al adulto no reproductivo, pero con un tono pardo en el manto.
Hábitat y distribución	Reside en zonas costeras, planicies intermareales de zonas protegidas y estuarios. Especie migratoria desde el extremo norte hasta Chiloé en época de verano.
Hábitos	Viven en comunidad. Descansa en playas o posado sobre rocas. Asociado a rayadores u otras especies de gaviotas o gaviotines. Vuela a gran altura. Caza en picada peces o crustáceos pequeños. Comen su alimento en grupos de su misma especie.

Nombre común	Gaviotín sudamericano
Nombre científico	<i>Sterna hirundinacea</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Laridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Plumaje reproductivo: Pico color rojo de aspecto fino y alargado, patas en el mismo color. Capucha color negro pasando por la frente, nuca y bajo el ojo. Dorso del ala y partes superiores en tono gris perla, mientras que la zona inferior es blanca con tonos grises en el pecho.

	Plumaje no reproductivo: Pico en color rojo, aunque algunos tienen la base oscura, patas en el mismo tono. Zona frontal y corona blancas, contrastante con la nuca y parche ocular, los cuales son negros y forman una capucha incompleta difusa, además sus partes inferiores son blancas. Inmaduros: Primer año de vida. Pico negro y patas rojas. Manto gris claro y cabeza blanca con capucha negra de bordes difusos. Presenta moteadas las coberteras alares y una mancha oscura por el dobléz del ala visible cuando esta posado. Juvenil: Pico oscuro y patas rosadas. Corona, manto y alas oscuras con líneas blancas y ocre. Zona inferior en un tono blanco sucio.
Hábitat y distribución	Reside en variados tipos de costas marinas, sobre todo en zonas litorales. Se distribuye desde la zona norte hasta Cabo de Hornos. Algunos migran hacia el norte en invierno mientras que otros se quedan en la Patagonia.
Hábitos	Desde pequeños grupos a numerosas bandadas. Alcanza gran altura en vuelo para luego lanzarse en picada sobre cardúmenes de peces. Descansa sobre algas o playas de arena o pedregosas.

Nombre común	Golondrina chilena
Nombre científico	<i>Tachycineta meyeni</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Hirundinidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico color negro, ancho de aspecto fino, patas de igual color. Partes superiores del cuerpo color negro con brillo azul, al igual que las alas, la cola es color negro y zona inferior del cuerpo color blanco. Ejemplar juvenil semejante al adulto, pero sin brillo azulado, además presenta una coloración pardo ahumado en los lados del cuello y flancos.
Hábitat y distribución	Reside en matorrales, campos, bosques, zonas abiertas y humedales. Se distribuye desde el Valle de Copiapó hasta Los Lagos en invierno y llega hasta Magallanes en verano. En invierno migra hacia el norte por Argentina hasta Bolivia, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil.

Hábitos	En grupo y ocasionalmente en numerosas bandadas. Planea a baja y mediana altura a gran velocidad. Vuelo ágil.
----------------	---

Nombre común	Golondrina dorso negro
Nombre científico	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Hirundinidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico y patas negras y pequeñas. La cabeza y zona superior del cuerpo son color negro con brillo azulad, al igual que alas y cola, esta última algo abierta y terminada en punta. Mentón y zona inferior color blanco con toques grises en flancos. Ejemplar juvenil similar al adulto pero manchado de un pardo pálido en pecho, lados del cuello y flancos, además es de coloración más opaca sin brillo.
Hábitat y distribución	Reside en matorrales abiertos, barrancos costeros, riberas y zonas de cultivo o ganado. Presente en gran parte de Chile, desde la región de Atacama hasta el Estrecho de Magallanes.
Hábitos	Bandadas disgregadas y en asociación con otras aves en zonas de alimento. Planea veloz y a baja altura. Nidifica en muros, quebradas o bordes de caminos.

Nombre común	Gorrión
Nombre científico	<i>Passer domesticus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Passeridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Especie con dimorfismo sexual. Macho: Pico color negro con forma cónica. Presenta una coloración negra a modo de antifaz y pechera en el mentón, contrastante con sus mejillas blancas, corona gris con toque rufo a los lados del cuello. Manto y alas color canela con un leve estriado oscuro. La zona inferior del cuerpo es en tono gris blanquecino. Hembra: Pico color pardo. De color pardo con manto más oscuro. La corona oscura le hace notar una línea a modo de ceja que se

	extiende hasta las mejillas. Alas oscuras con manchado blanco en el medio.
Hábitat y distribución	Cercanos a ciudades, poblados y zonas rurales. Especie introducida de rápida expansión encontrándose en gran parte del país, incluso habiendo registro en Isla de Pascua, Isla Santa María, Isla Mocha y Juan Fernández.
Hábitos	Muy sociable, aunque competitivo con otras especies como el chincol y la diuca. Nidifica en construcciones humanas.

Nombre común	Guanay
Nombre científico	<i>Phalacrocorax bouganvilli</i>
Orden	Suliformes
Familia	Phalacrocoracidae
Estado de conservación	NT, casi amenazado
Identificación	Posee un pico largo en tono gris cuerno. Cuello largo y cola corta. Patas color rosado. Cresta eréctil en la frente. Coloración roja alrededor del ojo, zona superior color negro con brillo violeta al igual que el cuello y cabeza, desde la garganta hasta el final del cuerpo posee un color blanco. Presenta plumaje en reposo con una coloración más opaca, sin cresta. Ejemplar juvenil presenta una coloración pardo sucio en cabeza y partes superiores, además sin mancha ocular roja.
Hábitat y distribución	Reside en zonas costeras de litoral rocoso. Se distribuye desde el extremo norte hasta Chiloé. Existe una pequeña población en costa de Chubut en Argentina.
Hábitos	Vive en comunidad, realizan vuelos bajos en hilera formando una “v”. Descansa en rocas y nidifica en planicies de islotes entre primavera y verano.

Nombre común	Halcón peregrino
Nombre científico	<i>Falco peregrinus</i>
Orden	Falconiformes
Familia	Falconidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	No presenta dimorfismo sexual, sin embargo, existe una pequeña diferencia de tamaño entre el macho y

	la hembra, siendo esta última más grande. Posee una gran cabeza, alas con forma puntiaguda grises y cola pequeña gris con toques negros. Grandes patas amarillas, pico gris con tonos azules y negro en la punta. Posee una capucha negra, la cual varía según el ejemplar, zona superior color gris e inferior color blanco. Raza <i>tundrius</i>, presenta capucha oscura con un color blanco en la zona auricular. En la raza <i>cassini</i>, la copucha puede ser completa o triangular, la zona inferior de esta raza es color café. Esta raza presenta dismorfia, ya que posee una fase pálida, aunque esta solo ha sido observada en ejemplares de la zona sur. En esta fase la cabeza es blanca con capucha poco visible. Juvenil: Similar al adulto con tonos pardos en la zona superior y un tono ocre en el vientre.
Hábitat y distribución	Reside en todo tipo de ambientes desde bosques abiertos, valles desérticos, laderas, costas marinas, humedales hasta cercanías de urbes. Raza <i>cassini</i> se distribuye desde Atacama hasta Tierra del Fuego, aunque prefiere regiones más patagónicas. En cambio, <i>tundrius</i> se distribuye desde Arica hasta Los Lagos en épocas de verano.
Hábitos	Solitario o en pareja. Caza cayendo en picada sobre su presa, acecha desde las alturas. Vuelo veloz.

Nombre común	Huairavo
Nombre científico	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Orden	Pelecaniformes
Familia	Ardeidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Garza de gran tamaño, posee pico color negro, corto y aguzado, patas color amarillo o verdoso e iris rojo. Zona superior, corona y manto color negro con brillo verde azulado, el resto de la cara y cuello son color pardo pálido. Presenta largas plumas blancas en la nuca. Alas en tono gris pizarra oscuro. Juvenil: Pico color amarillo con negro, patas gris oliva e iris anaranjado. Es de color café oscuro con motas blancas en alas.

Hábitat y distribución	Reside en ambientes cercanos a cuerpos de agua, ya sean dulces o salados, zonas abiertas o forestadas, litoral marino, altiplano y cordillera, además ingresa a pueblos y ciudades. Se distribuye ampliamente desde el extremo norte hasta el extremo sur del país.
Hábitos	Solitario, pareja o más frecuentemente en comunidad sobre todo en dormideros o sitios donde se alimenta. Toma descansos o nidifica sobre el follaje o pajonales. Fuerte sonido de alarma. Acecha a sus presas, incluso llega a comer crías de otras aves. Es de hábitos más bien nocturnos, aunque igualmente se le puede observar activo durante el día. Vuela a un ritmo lento y con pausas.

Nombre común	Huala
Nombre científico	<i>Podiceps major</i>
Orden	Podicipediformes
Familia	Podicipedidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un largo y estilizado cuello. Pico color negro, e iris rojizo. Pequeña cresta en la nuca. Partes superiores, cabeza, zona trasera del cuello y alas color gris pizarra. Zona delantera del cuello y pecho color rufo o rojizo anaranjado, resto del cuerpo por la parte inferior color blanco, además posee una cola vestigial. Plumaje invernal: Coloración apagada, el pico cambia a un color más neutro, al igual que la zona superior se torna color café y la coloración rufa se torna blanca, sobre todo en la zona de la cara y el pecho.
Hábitat y distribución	Generalmente cercano a todo tipo de cuerpos de agua, sobre todo humedales y bahías. Se distribuye por la costa entre Arica y Taltal, sin embargo, la raza <i>navasi</i> , se distribuye desde el Biobío hasta Cabo de Hornos.
Hábitos	Solitaria, pareja o grupos, a pesar de ser territorial puede compartir espacio con otras especies de aves más que nada acuáticas. Se agrupa en bandada durante otoño e invierno. Posee un melancólico y fuerte silbido. Nidifica en humedales con pajonal o

	vegetación, ya que construye nidos semi flotantes o en islotes en primavera. Duerme flotando y evita volar.
--	---

Nombre común	Hued Hued
Nombre científico	<i>Pterotochos tarnii</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Rhinocryptidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico y patas en color negro, las cuales tienen dedos y uñas muy largas. Iris en tonos café rojizo con anillo orbital blanco opaco. Cuello, pecho y manto color gris, zona inferior castaña con abdomen rojizo de escamado oscuro. Cola color negro.
Hábitat y distribución	Reside en bosques templados húmedos y sotobosque denso, aunque también puede ser abierto. Se distribuye desde el sur del río Biobío e Isla Mocha hasta Magallanes. Igualmente se encuentra en regiones boscosas del suroeste argentino.
Hábitos	Solitario, parejas o grupos pequeños. Difícil de observar, aunque su canto lo deja al descubierto. Ave más bien terrestre, aunque trepa por el follaje. Escarba el suelo para conseguir alimento.

Nombre común	Jilguero
Nombre científico	<i>Sporagra barbatus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Fringillidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Especie con dimorfismo sexual. Pico color gris rosáceo, corto con forma cónica, patas del mismo tono. Macho: Color oliva, con corona y mentón negro. La zona inferior es amarilla con un tinte blanco en la parte baja del abdomen. El manto presenta un tenue jaspeado oscuro. Cola color negro. Hembra: Presenta un color amarillo más apagado no posee color negro en la corona.

Hábitat y distribución	Reside en zonas con vegetación, matorrales, bordes de bosques y cuerpos de agua. Se distribuye desde el valle de Copiapó hasta Cabo de Hornos, también se encuentra en el centro sur de Argentina e Islas Malvinas.
Hábitos	Parejas o grandes bandadas. Se alimenta al interior del follaje y en el suelo. El trino que emite es agudo con tonos metálicos.

Nombre común	Jote cabeza colorada
Nombre científico	<i>Cathartes aura jota</i>
Orden	Cathartiformes
Familia	Cathartidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave que puede doblar su tamaño en vuelo, posee un pico color cuerno, patas grises casi blancas e iris café. Cabeza y base del pico sin plumas en color rosado fuerte, casi rojo. Color café con tonos negros y brillo azul en partes superiores. Las plumas de la parte inferior del ala son grises contrastando con el resto del ala y cuerpo color negro. Cola de gran tamaño con forma redondeada color gris.
Hábitat y distribución	Reside en terrenos abiertos preferentemente cerca de la costa, llanos y valles de interior. Especie de mayor rango de distribución en el país y en el continente, se mueve por la costa.
Hábitos	Generalmente solitario, aunque se puede avistar en pequeños grupos. Especie carroñera, depreda huevos y crías de otras aves. Largos planeos a gran altura.

Nombre común	Jote cabeza negra
Nombre científico	<i>Coragyps atratus foetens</i>
Orden	Cathartiformes
Familia	Cathartidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Por la longitud de las alas llega a doblar su tamaño en vuelo. Posee un pico largo y de aspecto delgado negro con punta clara. Patas grises casi blancas e iris en tono café oscuro. Posee coloración negra con cabeza y parte del cuello sin plumas de aspecto

	arrugado color gris. Alas alargadas y con forma rectangular. Cola corta y cuadrada.
Hábitat y distribución	Reside en ambientes abiertos preferentemente cerca de villas y puertos de pesca, además cercano a costas y valles interiores. Comúnmente se distribuye desde Copiapó hasta Aysén, a pesar de estar presente en todo Chile, raramente es avistado en el extremo norte.
Hábitos	Gregario y carroñero, se juntan en grupo en lugares como basurales o donde puedan encontrar comida. Planea a gran altura.

Nombre común	Lechuza
Nombre científico	<i>Tyto alba</i>
Orden	Strigiformes
Familia	Tytonidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Presenta un característico disco facial color blanco con bordes oscuros. Ojos pequeños con iris oscuro y largas patas color rosado con plumas hasta la base. Pico en color cuerno a rosado. De frente se observa una delgada pero oscura línea en “V” que une los ojos con el pico. Corona, partes superiores de alas y cola presentan moteado gris pálido con puntos blancos. Partes inferiores blancas en machos y ocre en hembras. Ambos poseen moteado oscuro en pecho y abdomen. Juvenil: Moteado oscuro en zona inferior.
Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas como campos, también en ciudades, parques y construcciones abandonadas. Su distribución abarca todo Chile, además se encuentra ampliamente en Sudamérica.
Hábitos	Solitaria, pareja o familias. De hábitos nocturnos, durante el día se encuentra inmóvil, durmiendo posada en árboles o construcciones, donde también anida. Vuela lento y en silencio para cazar pequeños roedores. Presenta un sonido característico y un tipo de chasquido ante intrusos.

Nombre común	Lile
Nombre científico	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>
Orden	Suliformes
Familia	Phalacrocoracidae
Estado de conservación	NT, casi amenazada
Identificación	Posee un largo y delgado cuello, además de una corta cola. Pico amarillo anaranjado con punta gris. Patas color rojo o naranja. Iris calipso verdoso. Presenta plumas filamentosas y muy delgadas color blanco a los lados de la cara contrastantes con su cuerpo color gris pizarra, además esta manchada de blanco por los lados del cuello. Juvenil: Zona superior del cuerpo pardo ahumado con un tono más oscuro en el cuello, zona inferior blanca con tonos pardo. Patas y pico oscuro.
Hábitat y distribución	Residente de costas marinas, se distribuye desde la zona norte hasta Aysén, aunque hay registros de anidamientos entre la Araucanía y Chiloé en primavera y verano. Especie endémica de la Corriente de Humboldt, igualmente existe una pequeña población en Isla Santa Cruz, Argentina.
Hábitos	Viven en colonias, desde pequeños grupos a numerosas bandadas. Anidan en acantilados e islotes junto a otros de su especie. Descansa sobre roqueríos.

Nombre común	Loica
Nombre científico	<i>Sturnella loyca</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Icteridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Presenta dimorfismo sexual. Posee un pico gris con tonos azules y punta negra, largo y cónico. Macho: Cabeza oscura casi negra, presenta línea superciliar blanca, además de una pinta blanca cerca de la comisura del pico. Corona con tenue línea central ante. Zona superior del cuerpo oscura al igual que alas y cola, además las plumas tienen un color ocre por los bordes. Garganta, pecho y parte superior del abdomen color rojo, el resto del cuerpo es oscuro con aspecto escamado.

	Hembra: Similar al macho, pero en tonos más claros. Banda superciliar color ante a blanco, zona del pecho color pardo con parte central del abdomen rosado.
Hábitat y distribución	Reside en ambientes cercanos a terrenos húmedos con vegetación arbustiva y pastizal, además de praderas, estepa patagónica y campos de cultivo. Se distribuye desde Copiapó hasta Tierra del Fuego, igualmente se encuentra en Isla Santa María e Isla Mocha en el Biobío e Islas Navarino en la zona austral.
Hábitos	Ave muy social, generalmente en pareja o familias y bandadas durante la época invernal. Se alimenta y nidifica en el suelo. Posee un característico canto. Vuelo a baja altura, recto y de larga duración. Ave muy ruidosa.

Nombre común	Mero
Nombre científico	<i>Agriornis lividus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico de aspecto grueso y largo en color negro y mandíbula color cuerno con un gancho en la punta. Patas e iris oscuros. Presenta una mancha redonda alrededor del ojo pálida. Partes superiores color pardo oscuro, zona abdominal y subcaudales presentan un color canela o rufo. Cola en color negro con delgado borde blanco. Garganta blanca con gruesas líneas negras longitudinales. Juveniles: Difuso jaspeado oscuro en partes superiores y no tienen tan marcadas las líneas de la garganta. Pico con mandíbula manchada de color cuerno y pardo.
Hábitat y distribución	Reside en laderas de cerros, matorral semi árido abierto con cactus y <i>puyas</i> , además de llanos litorales. Se distribuye desde Copiapó hacia la zona sur.
Hábitos	Solitario, pareja o grupos pequeños y dispersos. Se posa sobre arbustos, rocas, postes, etc. Puede comer insectos grandes, lagartijas, aves y roedores pequeños. Silencioso y distante, se oculta en la vegetación.

Nombre común	Mirlo
Nombre científico	<i>Molothrus bonariensis</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Icteridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave con dimorfismo sexual. Pico color gris con forma cónica y corto, patas negras e iris pardo oscuro. Macho: Coloración color negro con iridiscencia azul, la cual en cola y alas se vuelve verde. Hembra: De menor tamaño, presenta una coloración parda sutilmente más clara en zonas inferiores, corona, cola y alas son de un tono más oscuro. Juvenil: Similar a la hembra, con partes inferiores color ante grisáceo con suave estriado negro.
Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas, pastizales, cultivos, áreas ganaderas y agrícolas. Se distribuye desde la zona norte del país hasta Magallanes sin incluir Tierra del Fuego. Es una especie probablemente introducida.
Hábitos	Pequeños grupos y grandes bandadas en sitios utilizados como dormideros. Emite un canto muy musical mientras vuela. Se encuentra generalmente cerca del ganado, llegando incluso a posarse sobre este. Ave parásita, puede sustituir a gran velocidad la postura de huevos de otras aves.

Nombre común	Nuco
Nombre científico	<i>Asio flammeus</i>
Orden	Strigiformes
Familia	Strigidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Búho de pico color negro, patas anchas con garras y plumas hasta los dedos. Iris color amarillo con notorio anillo negro. La cara tiene forma de disco, circular, color ante con borde interior blanco y borde externo oscuro. Posee dos penachos auriculares pequeños no siempre visibles. Partes superiores y dorso alar café grisáceo y abundantes tonos ante, partes inferiores a excepción del cuello en tonos ante con estriado oscuro.

Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas y bajas, como humedales y praderas. Se distribuye desde Atacama y Coquimbo hasta Magallanes, especie migratoria hacia Tierra del Fuego. Existen registros de avistamientos en Juan Fernández y Robinson Crusoe.
Hábitos	Solitario o pareja. De hábitos más bien crepusculares para cazar, su alimentación se basa en roedores y aves pequeñas. Anida en el suelo. Vuela a baja altura planeando, muy silencioso.

Nombre común	Pato capuchino
Nombre científico	<i>Anas versicolor</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Pato pequeño de cuello grueso y cola corta. Pico color azul con amarillo en la mitad basal. Patas grises con tonos azules. Zona superior de la cabeza en color negro, esta mancha pasa por debajo del ojo y se extiende hasta la parte trasera del cuello, ya que la parte delantera es color ocre. Partes superiores en color café oscuro con borde ocráceo, alas en el mismo tono con la diferencia que presentan un espejo verde con una línea blanca por ambos bordes.
Hábitat y distribución	Reside en zonas de humedal y en cuerpos de agua dulce con abundante vegetación en sus orillas. Se distribuye desde Coquimbo a Magallanes, en invierno parte de su población migra hacia la zona centro norte del país.
Hábitos	Pareja o grupos pequeños. Anida entre la vegetación de humedales en primavera. En el invierno se agrupa en bandadas. Se puede observar nadando tranquilamente en aguas poco profundas.

Nombre común	Pato colorado
Nombre científico	<i>Anas cyanoptera</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	De cuello largo y cola corta color negro con borde ante. Especie con dimorfismo sexual. Macho: Pico color negro, patas amarillas con toques naranja e iris oscuro. Coloración rufa con la cara ligeramente más oscura. Alas negras con coberteras celestes y especulo verde, divididas por una línea blanca que se afina a medida que se acerca al cuerpo. Su plumaje no reproductivo es parecido a la hembra, pero con tonos rojizos y el iris se torna de color naranja. Hembra: Pico gris pizarra oscuro, patas café con tonos amarillos e iris oscuro. De color pardo con puntos grises en el pecho. Sus plumas presentan el centro color café lo que le da un aspecto moteado. La franja que separa la cobertera del espéculo es apenas notoria.
Hábitat y distribución	Reside en lagunas de poca profundidad y costeras, con vegetación de pajonal en las orillas, además de humedales, canales y ríos. Se distribuye por gran parte de Chile, parte de la población migra de sur a norte a mitad de año.
Hábitos	Pareja o grupos pequeños. Anida en humedales, entre la vegetación en época primaveral. Se asocia con otros patos. Es ágil para volar.

Nombre común	Pato cuchara
Nombre científico	<i>Anas platalea</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave con dimorfismo sexual. Posee una cola terminada en punta, pico más largo que su cabeza, ancho y aplanado. Macho: Pico oscuro, patas anaranjadas e iris blanco. Cabeza blanca con motas oscuras en corona y nuca. Coloración castaña con pecas negras. Cola color negro con borde ante y blanco. Alas oscuras con

	coberteras celestes y espéculo verde divididos por una línea blanca y ancha. Hembra: Presenta iris café oscuro, pico gris y patas anaranjadas. Coloración ante con manto oscuro. Presenta una constante mancha celeste en las coberteras y especulo color verde.
Hábitat y distribución	Reside en humedales con vegetación acuática, además de lagunas costeras y bahías marinas. Se distribuye desde Coquimbo hasta Chiloé y Canal del Beagle. En invierno los ejemplares más australes migran hacia Argentina.
Hábitos	Pareja o grupos con otras especies de patos. Anida en humedales, entre la vegetación en época de primavera. Gregario cuando no hay crías, llegando a formar bandadas de numerosos individuos. Filtra agua con su pico, por lo cual nada con la cabeza inclinada.

Nombre común	Pato jergón chico
Nombre científico	<i>Anas flavirostris</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee cuello y cola cortos. Pico amarillo con color negro en la punta y patas en color gris. Coloración pardo con cabeza y cuello oscuros. Plumas del manto y pecho presentan un tono oscuro en el centro lo que da apariencia manchada. Presenta espéculo oscuro con tornasol verdoso, borde castaño por arriba y ocre por debajo.
Hábitat y distribución	Reside en zonas acuáticas, bajas y costeras las cuales pueden tener o no vegetación. Bahías protegidas de la zona costera, marismas y planicies. Se distribuye entre la zona norte y Chiloé, igualmente puede ser avistado en la zona austral del país, estos ejemplares migran en invierno hacia Argentina.
Hábitos	En grupos y en pareja en época de reproducción. Anida en el suelo, entre la vegetación en épocas de primavera y verano. Sociable con otras aves acuáticas. Come a base de “pastoreo” en la vegetación de orillas.

Nombre común	Pato jergón grande
Nombre científico	<i>Anas georgica</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Pato estilizado, posee un largo cuello y una cola terminada en punta. Pico color amarillo con punta negra y patas grises. Es de color café con tonos ocre, similar a un tono caramelo, aunque la cabeza y zona inferior son más pálidas, garganta, pecho y abdomen color blanco. Algunas plumas en el centro tienen coloración oscura. Alas con coberteras grises y especulo verde oscuro con bordes ocre.
Hábitat y distribución	Reside en ambientes acuáticos de agua dulce o salada, bahías costeras, zonas intermareales y humedales. Se distribuye por gran parte de Chile, incluida la Isla Santa María e Isla Mocha en la región del Biobío y Cabo de Hornos en la zona austral, los cuales migran hacia el norte durante otoño e invierno.
Hábitos	Pareja en época de crías y en bandadas el resto del año. Anida en el suelo, entre la vegetación, ocasionalmente lejos de cuerpos de agua, entre invierno y verano, puede tener hasta dos puestas por temporada. Sociable con otras aves acuáticas. Busca comida entre vegetación emergente con técnica de ramoneo, puede comer algas o filtrar alimento en aguas poco profundas. Buen volador.

Nombre común	Pato rana pico delgado
Nombre científico	<i>Oxyura vittata</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Pato pequeño de cuerpo compacto, posee cabeza oscura y una larga cola, además el iris es color café oscuro. Presenta dimorfismo sexual. Macho: Pico grueso color celeste brillante con uña oscura. Patas oscuras. Coloración castaña a excepción del cuello y cabeza que son oscuros. Zona central del abdomen blanco, cola negra con plumas rígidas.

	Hembra: De coloración café ocre con notorias pero finas líneas oscuras a excepción del cuello que es blanco. Presenta una línea blanca por la mejilla.
Hábitat y distribución	Reside en humedales de poca profundidad y cuerpos de agua con vegetación y totorales en orillas. Se distribuye por zonas bajas y costeras desde Atacama hasta Los Lagos. Igualmente se encuentra en la vertiente este de los Andes hasta Magallanes.
Hábitos	Parejas o grupos pequeños, sociable con otras especies acuáticas como patos y aves. Buceador. En estado de alerta mantiene su cola erguida. Anida entre pajonales desde inicios de primavera.

Nombre común	Pato real
Nombre científico	<i>Anas sibilatrix</i>
Orden	Anseriformes
Familia	Anatidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color celeste y patas grises. Presenta un parche auricular en color blanco al igual que la cara, mientras que la cabeza y el cuello son oscuros con iridiscencia verde en la nuca. Estas características están presentes en la hembra, pero son menos notorias. Alas café oscuro con panel blanco y espéculo verde. Pecho color blanco con toques oscuros y flancos en tonos rufos.
Hábitat y distribución	Reside en zonas acuáticas de poca profundidad, zona intermareal, bahías y humedales. Se distribuye desde Atacama hasta el Canal Beagle, parte de la población migra desde Chiloé hacia el norte a mitad del año.
Hábitos	Pareja o familias, bandadas numerosas luego del periodo de cría. Sociable con otros tipos de aves acuáticas. Anida en el suelo, en la vegetación. Se alimenta a modo de “pastoreo” o filtración de comida en las orillas. Emite un ruidoso silbido al emprender vuelo a modo de alerta.

Nombre común	Pelicano
Nombre científico	<i>Pelecanus thagus</i>
Orden	Pelecaniformes
Familia	Pelecanidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee largo pico color amarillo con una línea roja en cada lado y una desnudez oscura en la base, además de una bolsa gular de color azul. Patas color gris pizarra. La cabeza es color amarillo dorado, al igual que la línea lateral del cuello, el resto de este es de color negro. Tenue cresta eréctil en la nuca. Zona superior y cola en colores café con abundante estriado blanco. Dorsal superior café oscuro con notorios parches en color gris perla en escapulares y plumas secundarias. Zona inferior del cuerpo color café oscuro con estriado blanco, notorio en el pecho. Plumaje de reposo: El color oscuro y amarillo de cabeza y cuello se torna de color blanco. Juvenil: Son coloración café ahumado con estrías claras, pecho blanco y pico color cuerno.
Hábitat y distribución	Reside en costas marinas, bahías y se asocia a puertos, igualmente habita las aguas de la Corriente de Humboldt, ya que es endémica de la zona. Se distribuye desde la zona norte hasta Aysén, aunque su reproducción la realiza en zonas litorales desde Antofagasta hasta la región del Maule.
Hábitos	Se puede observar en numerosos grupos, ya sea en vuelo de poca altura o descansando. Zambullidor. Ya que se asocia a puertos, comúnmente persigue las embarcaciones.

Nombre común	Perrito
Nombre científico	<i>Himantopus mexicanus</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Recurvirostridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Presenta un patrón blanco y negro muy característico en las plumas. Pico largo, delgado, y aguzado color negro. Patas largas y rosadas, las cuales sobrepasan la cola en el vuelo. Iris rojo. Cabeza, cuerpo y cola blancos, fina línea oscura detrás del ojo, la cual se

	extiende hasta la nuca y lados del cuello. Dorso alar y escapulares oscuras con brillo azul metálico. Juvenil: Presentan jaspeado oscuro en corona y manto, además la cola posee tintes cafés.
Hábitat y distribución	Reside en cuerpos de agua interiores, riberas de humedal y costa marina. Raza <i>melanurus</i>, se distribuye por zonas bajas y costeras desde Atacama a Valdivia, aunque puede encontrarse en la zona sur de Chiloé. La raza nominal se distribuye por la costa desértica de Arica.
Hábitos	Parejas o grupos. Camina dando zancadas. Sociable con otras aves acuáticas. Ruidoso en época de cría, emite un sonido similar al de un cachorro.

Nombre común	Peuco
Nombre científico	<i>Parabuteo unicinctus</i>
Orden	Accipitriformes
Familia	Accipitridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave rapaz, caza para alimentarse. El pico es color gris azulado con punta negra y alargado. Cera y patas en amarillas. Su cuerpo es delgado en colores café oscuro con motas blanquecinas en el abdomen. Fina banda detrás del ojo en tonos amarillos. Escapulares, coberteras alares y “calzones” rufos, la cola es oscura con notoria banda terminal color blanco. Juvenil: Es de coloración café con tinte amarillo, además de un notorio jaspeado oscuro en zonas inferiores, la banda detrás del ojo cambia a un color ocráceo. La zona superior del cuerpo y dorso de las alas son de un café grisáceo con motas en tonos ocre. “Calzones” café con tonos amarillos, la cola gris con tonos oscuros y punta color blanco.
Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas con cobertura arbórea, pastizales, quebradas semi desérticas y laderas de cerros. Se distribuye por los valles y oasis nortinos, llegando hasta el Biobío y más al sur hasta Chiloé, igualmente se encuentra en Aysén, pero de forma más ocasional.
Hábitos	Solitario, pareja o familias. Sedentario. Largos planeos a gran altura formando círculos,

	ocasionalmente en grupos. Realiza vuelos en épocas reproductivas.
--	---

Nombre común	Picaflor
Nombre científico	<i>Sephanoides sephaniodes</i>
Orden	Apodiformes
Familia	Trochilidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	De cuerpo compacto. Pico color negro corto y puntiagudo. Presenta mancha blanca detrás del ojo. Patas color gris. Cabeza y zona superior del cuerpo son color verde metálico con un tenue brillo, aunque la corona y frente presentan un llamativo color rojo, esto solo en el macho, zona inferior en tonos claros con toques verde iridiscente. Cola corta con forma redondeada.
Hábitat y distribución	Reside en bosques, cercano a arbustos con flores llamativas. En época de migración se encuentra en zonas semi áridas en el norte y estepa en el sur. Se distribuye desde Coquimbo hasta zona austral del Canal Beagle y Magallanes. Algunos ejemplares migran en invierno hacia Antofagasta, también presente en Isla Robinson Crusoe y Argentina.
Hábitos	Solitario, pareja o grupos poco numerosos. Vuelo veloz a gran altura, mantiene un vuelo estático a la hora de alimentarse. En invierno algunos entran en estado de letargo quedando inmóviles.

Nombre común	Picaflor gigante
Nombre científico	<i>Patagona gigas</i>
Orden	Apodiformes
Familia	Trochilidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee alas y cola notoriamente largas. Pico color negro, alargado y puntiagudo. Patas oscuras. Partes superiores del cuerpo, coberteras alares y cola café grisáceo con toques verdosos brillantes. Visible rabadilla blanca. Zonas inferiores café grisáceas con tonos canela. La hembra es similar al macho solo que con una coloración más opaca.
Hábitat y distribución	Reside en zonas semiáridas con abundante vegetación dispersa como quebradas y acantilados.

	Cercano a zonas pobladas. Frecuenta la costa desértica debido a la floración por estaciones. Se distribuye entre octubre y marzo desde la zona costera sur de Antofagasta hasta la región de la Araucanía. En época invierno migran hacia el norte de Argentina, además se encuentra en Perú, Bolivia y Ecuador.
Hábitos	Solitario o pareja. Se alimenta sin posarse de néctar de flores llamativas, también de eucaliptus. Cierta grado insectívoro. Frecuenta descansos por largos periodos de tiempo. Nidos pequeños de los que sobresale su cuerpo, usualmente los construye en ramas de baja altura. Silbido fuerte.

Nombre común	Picurio
Nombre científico	<i>Podilymbus podiceps</i>
Orden	Podicipediformes
Familia	Podicipedidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Pico de aspecto grueso color blanco con línea vertical negra. Mancha circular alrededor del ojo color blanco, contrastante con iris café. Zonas superiores del cuerpo incluyendo cabeza y cuello son color gris a excepción de la garganta que es negra. Zona abdominal y subcaudales color blanco. Plumaje invernal: El color gris de cabeza y zona superior se torna café con tonos grises, mientras que la zona inferior se torna ocre y la garganta pasa de negro a blanco. La línea del pico es apenas visible y desaparece el color negro de esta.
Hábitat y distribución	Reside en grandes cuerpos de agua de baja profundidad con vegetación abundante en orillas, además de humedales costeros. Se distribuye desde Copiapó hasta Chiloé y zona norte de Aysén, igualmente fuera del país se distribuye desde Alaska hasta centro y sur américa incluyendo el Caribe.
Hábitos	Solitario, pareja o grupos, no se agrupa en bandada. Buen buceador. Ante amenazas se mete al agua a esconderse entre la vegetación dejando la cabeza afuera. Le cuesta volar, debe emprender carrera para

	tomar vuelo. Anida sobre vegetación flotante escondida a comienzos de primavera.
--	--

Nombre común	Pidén
Nombre científico	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>
Orden	Gruiformes
Familia	Rallidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Pico largo, levemente curvo color amarillo con tonos verdes, posee una mancha roja en la base y azul en maxila. Patas color rojo con dedos largos. Iris rojizo. Coloración gris pizarra, aunque la corona, zona posterior del cuello, dorso y alas son café oliva, igualmente la cola es café, pero de un tono oscuro. Juvenil: Pico y patas oscuras, además su cuerpo es pardo con tonos oliva en manto y alas. Raza <i>simonsi</i>, pequeña con tonos oliva en zonas superiores. Raza <i>luridus</i>, es de mayor tamaño, aunque con la cola más corta, presenta tonos rojizos en el dorso y la mancha roja del pico es más pequeña o ausente.
Hábitat y distribución	Reside en humedales con vegetación abundante, además de zonas anegadas y costas. Se distribuye por la alta cordillera de Antofagasta y desde Copiapó hasta Aysén. Existen registros en Isla Santa María e Isla Mocha en Biobío. También se encuentra en países como Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Hábitos	Solitario, en algunas ocasiones se puede encontrar en grupos. Actividad crepuscular. Se oculta en la vegetación, aunque sale ocasionalmente a zonas abiertas a la hora de alimentarse.

Nombre común	Pilpilén
Nombre científico	<i>Haematopus palliatus</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Haematopodidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico largo de aspecto agudo color rojo con tonos naranja y punta amarilla. Patas rosadas. Iris color amarillo contrastante con anillo orbital rojo.

	Cabeza, cuello y pecho negros, el resto de la zona superior color café. Cola oscura con plumas laterales claras. Alas cafés, aunque durante el vuelo y en estado de reposo se deja observar un color blanco en la zona interna. Las zonas inferiores del cuerpo son blancas. Juvenil: La capucha se torna color café oscuro, iris gris y el pico es completamente negro.
Hábitat y distribución	Reside en zonas costeras, sobre todo en playas arenosas. Se distribuye desde la zona norte del país hasta Chiloé y región de Aysén. Migratorio por Tierra del Fuego y Magallanes. Durante el invierno ejemplares australes migran hacia el norte por la costa.
Hábitos	Parejas o grupos pequeños, en algunas ocasiones en bandadas. Se alimenta en zonas intermareales. Vuelos amenazantes cuando hay intrusos cerca del nido o crías, también finge estar herido. Fuerte y característico silbido, generalmente en parejas. Descansa sobre una pata solamente.

Nombre común	Pilpilén negro
Nombre científico	<i>Haematopus ater</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Haematopodidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Coloración general oscura. Pico largo con punta roma color rojo con tonos naranjos. Patas rosadas blanquecinas con uñas color negro. Presenta iris amarillo muy contrastante con su anillo orbital rojo. Capucha, zonas inferiores y cola color negro brillante, en cuanto las zonas superiores y dorso alar, adquieren un color café chocolate. Las alas presentan tonos plateados en algunas plumas por la zona inferior.
Hábitat y distribución	Reside en zonas costeras, preferentemente en playas rocosas. Se distribuye por toda la zona litoral del país. Existen avistamientos en Juan Fernández. Se desplaza por la zona norte hasta Perú e igualmente se encuentra en Argentina, Uruguay e Islas Malvinas
Hábitos	Parejas o familias. Territorial en época de reproducción y en bandadas durante el reposo. Come

	moluscos en las zonas intermareales. Anida en islotes o lejos de la costa. Fuerte y duradero silbido.
--	---

Nombre común	Pimpollo
Nombre científico	<i>Rollandia rolland</i>
Orden	Podicipediformes
Familia	Podicipedidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico corto color negro. Iris rojo. Penacho auricular color blanco con líneas negras. Partes superiores incluyendo la cabeza, pecho y cuello color negro brillante. Alas negras con tinte blanco en las plumas secundarias. Zona inferior del cuerpo rufa, además posee una cola vestigial. Plumaje invernal: Coloración más apagada, el color de la cabeza y partes superiores se tornan color café y la zona inferior adquiere un color ocre, además el penacho es menos notorio. Juvenil: Presenta notorias líneas negras en la cara color blanco, lo demás es similar al plumaje de invierno.
Hábitat y distribución	Reside en aguas poco profundas con abundante vegetación emergente, además de humedales de interior y bahías. En invierno prefiere estuarios y costas marinas, en su distribución sur. Se distribuye desde el extremo norte hasta la zona sur de Magallanes por medio de humedales. Ocasional desde Parinacota hasta Antofagasta por lagos y lagunas altiplánicas. También se encuentra en Perú, Bolivia, Argentina e Islas Malvinas.
Hábitos	Solitario, parejas, familias y bandadas durante época de invierno. Acuático, nadador y zambullidor. Anida en vegetación flotante y escondida durante primavera.

Nombre común	Piquero
Nombre científico	<i>Sula variegata</i>
Orden	Suliformes
Familia	Sulidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico largo y agudo gris con tonos azules, patas en el mismo tono. Iris rojo. Cuerpo blanco a

	excepción de la zona superior y alas que son café con abundante tinte blanco. Cola café oscuro con plumas centrales y base blanca. Zona interna del ala café oscuro, manchada de blanco en zona axilar y dos finas líneas en el mismo color en coberteras. Juvenil: Semejante al adulto, aunque la cabeza y cuerpo se tornan ocre. Abundantes tonos blancos en zonas inferiores y el iris se torna café amarillento.
Hábitat y distribución	Reside en zonas litorales costeras, también en aguas bajas de la Corriente de Humboldt. Se distribuye desde la zona norte hasta Chiloé, igualmente se encuentra en Isla Santa María e Isla Mocha en Biobío donde anida. Especie endémica de la Corriente de Humboldt.
Hábitos	Viven en comunidad y forman numerosas bandadas persiguiendo cardúmenes a los cuales se lanza de manera casi completamente vertical. Vuela a poca altura en formación de hilera. Descansa en las rocas extendiendo sus alas para secarse. Anida en islotes y acantilados junto a otras aves durante primavera y verano.

Nombre común	Pitio
Nombre científico	<i>Colaptes pitius</i>
Orden	Piciformes
Familia	Picidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee un pico oscuro, patas color gris e iris amarillo, además de una capucha oscura en la cabeza. El macho posee una banda malar oscura. Cara y cuello colores ante, zonas superiores y dorso alar color café oscuro con abundante tinte blanco. Cola oscura, plumas centrales sobresalen ya que, son alargadas y puntiagudas. Zona inferior del cuerpo blanca con líneas oscuras a excepción del centro del abdomen y subcaudales. Juvenil: El iris se torna celeste y presenta abundante escamado claro en la corona.
Hábitat y distribución	Reside en bosques forestales abiertos, laderas semi áridas de matorral y faldas de precordillera. Se distribuye desde la región de Coquimbo hasta el sur de Magallanes e Islas Navarino. También se encuentra en zonas forestales cercanas en Argentina.

Hábitos	Parejas o familias. Vuelo con ondulación. Busca insecto y larvas en cortezas o troncos caídos, aunque también se alimenta en el suelo.
----------------	--

Nombre común	Pitotoy chico
Nombre científico	<i>Tringa flavipes</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Scolopacidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Plumaje no reproductivo: Posee un pico alargado y fino color negro con amarillo en la base mandibular. Patas largas color amarillo. Presenta un anillo orbital claro, no muy notorio. Su pequeña cabeza y largo cuello son color gris ahumado con líneas blancas, el resto de la zona superior y alas en el mismo color sin estriado. Manto y dorso alar con finas manchas blancas. Cola y partes inferiores blancas con tonos oscuros, especialmente en flancos. Plumaje reproductivo: Las manchas del manto son más notorias al igual que las líneas oscuras del pecho y flancos. Juvenil: Manchas blancas aún más notorias, sin color oscuro en flancos y el pico es completamente negro.
Hábitat y distribución	Reside en cuerpos de aguas poco profundos, estuarios, lagos y lagunas, humedales y planicie intermareal costera. Se distribuye por gran parte del país desde la zona norte migra hacia la zona sur entre los meses de octubre y marzo. Migra en otoño hacia zonas árticas de Norteamérica donde anida.
Hábitos	Grupos disperso donde se asocia a Pitotoy Grande y otras aves. Camina dando zancadas y ocasionalmente nada. Busca alimento enterrando el pico en el suelo o recolectando presas. Característico sonido de alerta de dos notas.

Nombre común	Pitotoy grande
Nombre científico	<i>Tringa melanoleuca</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Scolopacidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Plumaje no reproductivo: Posee un pico largo, ligeramente levantado negro con tinte oliva en la

	base. Patas largas color amarillo. Presenta anillo orbital blanco. Cabeza y cuello color gris ahumado con finas líneas blancas, el resto de las partes superiores y alas son del mismo color, pero sin estriado. Manto y dorso alar con abundantes motas blancas. Cola, zona inferior y flancos blancos con toques oscuros. Plumaje reproductivo: El pico se torna completamente oscuro y las motas de flancos se vuelven más notorias, además se extienden por pecho y abdomen. Juvenil: Motas blancas aún más notorias, además el pico es completamente oscuro.
Hábitat y distribución	Reside en cuerpos de aguas poco profundas, humedales, riberas y bordes costeros. Se distribuye por todo el país al ser una especie migratoria, sobre todo entre octubre y marzo. Migra en otoño hacía zonas árticas de Norteamérica donde anida.
Hábitos	Solitario o en grupos pequeños asociado a Pitotoy Chico y otras aves. Camina dando zancadas. Vuela a baja altura con aleteos lentos. Sonido de alerta de tres notas.

Nombre común	Rara
Nombre científico	<i>Phytotoma rara</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Cotingidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico corto y grueso color negro. Patas grises e iris rojo. Especies con dimorfismo sexual. Macho: Corona y frente color rufo, zona periocular oscura, con fina banda detrás del ojo bordeando la zona auricular y banda malar blanca. Zona superior del cuerpo café oscuro con bordes ante grisáceo en las plumas. Alas negras con color blanco en coberteras menores y medianas, además, posee una delgada línea blanca por el borde de coberteras mayores. Cola café oscuro, con color rufo en la base de las plumas a excepción del par central. Zona inferior rufa brillante con tonos oscuros en flancos. Hembra: Barbilla y frente en tonos rufos o canela. Zona inferior del cuerpo color blanco con vistosas

	líneas café oscuro en pecho, abdomen y flancos. Las alas presentan dos finas líneas color ante en coberteras.
Hábitat y distribución	Reside en bosques y áreas abiertas arbustivas, inclinándose más por lugares con presencia de Ciruelillo. También en zonas de cultivo y parques. Se distribuye desde Atacama hacia el sur. Es migratorio desde el sur hasta Tierra del Fuego desplazándose por la precordillera entre agosto y marzo. Igualmente se encuentra en Argentina.
Hábitos	Solitaria, parejas o pequeños grupos. Se observa posada en altura, casi nunca en el suelo. Come brotes y frutos que corta con el pico. Característico sonido de alerta.

Nombre común	Rayadito
Nombre científico	<i>Aphrastura spinicauda</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico corto y fino color negro con base de la mandíbula color cuerno. Patas color gris. Presenta antifaz negro al igual que la corona, contrastante con la banda ocre que le recorre desde la frente hacia atrás por encima de los ojos. Manto café con tonos grises y rabadilla color rufo. Alas negras con dos líneas alares ocre, la primera por la base de primarias y secundarias y la segunda por la cara interna de secundarias. Cola larga y rufa con extensión de raquis, además poseen tonos oscuros en la zona terminal de las plumas, zona inferior del cuerpo blanca a excepción de flancos y subcaudales que son ocre.
Hábitat y distribución	Reside en zonas forestadas, bosques, plantaciones, sotobosque y zonas arbustivas. Se distribuye por la zona sur y austral del país, por el Archipiélago de Aysén y Magallanes. Igualmente se encuentra en Argentina.
Hábitos	Viven en comunidad y además se asocian a otras aves. Se mueve entre los árboles merodeando por el follaje.

Nombre común	Rayador
Nombre científico	<i>Rynchops niger</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Laridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Especie con dimorfismo sexual ya que, el macho es más grande que la hembra. Además, posee un pico más largo, este último es negro con un color rojo en la base y mandíbula más alargada que maxila. Patas pequeñas color rojo. Plumaje reproductivo: Presenta una capucha color negro, mismo color en zona superior, dorso y cola, esta última es pequeña y redondeada. Alas largas con forma puntiaguda, además son color gris por la parte inferior. Frente, cara y zona inferior del cuerpo en blanco. Plumaje no reproductivo: Presenta un color blanco en la nuca, dividiendo la capucha del resto del cuerpo.
Hábitat y distribución	Reside en costas marinas, bahías protegidas y desembocaduras. Se distribuye entre septiembre y abril desde el extremo norte hasta Los Lagos. Ocasionalmente hasta Magallanes por la vertiente atlántica.
Hábitos	Se encuentra generalmente en numerosas bandadas y asociado a gaviotas y gaviotines. Vuelo a baja altura preferentemente durante el día. Captura peces con la mandíbula en el agua y el pico abierto.

Nombre común	Runrun
Nombre científico	<i>Hymenops perspicillatus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Especie con dimorfismo sexual. Posee un pico color amarillo, al igual que el iris y patas color negro. Macho: Coloración completamente negra. Vistoso anillo orbital amarillo. Presenta un color blanco en plumas primarias de la punta del ala. Hembra: El anillo orbital no es tan llamativo, línea superciliar color ante. Zona superior del cuerpo y cabeza café oscuro con tinte ante. Alas café oscuro

	con tonos ante por coberteras al igual que la cola. Zona inferior del cuerpo ante más oscuro en pecho. Juvenil: Semejante a la hembra con iris oscuro sin anillo orbital.
Hábitat y distribución	Reside en zonas periféricas de lagunas de pajonal, en cercanías de cuerpos de agua y matorral, además de humedales de interior o costeros. Se distribuye según la estación del año ya que, es una especie migratoria en Chile.
Hábitos	Solitario o pareja, aunque guarda su distancia, come en el suelo. Sus alas emiten un zumbido al volar, además realizan vuelo nupcial.

Nombre común	Siete colores
Nombre científico	<i>Tachuris rubrigastra</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color negro agudo y corto, patas en el mismo color e iris celeste. Cara negra con tonos azules por los lados con pequeña mancha roja en la nuca, además de una larga y fina línea superciliar amarilla. Zona superior del cuerpo color verde, alas oscuras con notoria banda color blanco, cola corta color negro. Zona inferior del cuerpo color amarillo con semi collar oscuro a excepción de la garganta la cual es blanca y subcaudales rojas. Hembra: Similar al macho, con coloración opaca. Juvenil: Sin coloración azul en la cara, poseen escamas amarillas o blancas en la zona superior.
Hábitat y distribución	Reside en pantanos con abundantes juncos en las orillas, igual habita lagunas y ríos. Se distribuye desde Atacama incluyendo Llanquihue hasta Chiloé. Se puede encontrar en verano por Aysén y Magallanes.
Hábitos	Solitario, pareja o familias pequeñas, viven dentro de los juncales, salta entre estos buscando alimento.

Nombre común	Tagua
Nombre científico	<i>Fulica armillata</i>
Orden	Gruiformes
Familia	Rallidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico y escudo frontal color amarillo divididos por una línea color rojo extendida hasta el culmen. Patas color oliva con dedos redondeados. Iris rojizo, contrastante con cabeza y cuello negros. Coloración gris pizarra con tonos pálidos en la zona inferior. Plumas blancas color negro en el centro. Juvenil: Pico completamente amarillo, incluyendo culmen y base. Coloración gris siendo cabeza y cuello más pálidos.
Hábitat y distribución	Reside en cuerpos de agua dulce como lagos y lagunas con vegetación, además de humedales. Se distribuye desde el Valle de Copiapó en la región de Atacama hasta Magallanes, también se encuentra en Argentina, Brasil y Uruguay.
Hábitos	Parejas, grupos pequeños o bandadas de varios individuos, esto último especialmente en invierno donde se asocia a otras especies de tagua. Muy territorial en época de reproducción. Acuática, se alimenta en las orillas, buscando comida entre la vegetación. El macho emite un silbido y la hembra cacarea.

Nombre común	Tagua frente roja
Nombre científico	<i>Fulica rufifrons</i>
Orden	Gruiformes
Familia	Rallidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico amarillo brillante con tono pálido en la punta, escudo frontal color rojo que se extiende por el culmen y base del pico. Patas color oliva con dedos redondeados. Iris café con un toque rojizo. Coloración gris pizarra con tonos pálidos en la zona inferior del cuerpo, esto a excepción del cuello y cabeza, los cuales son color negro. Las subcaudales color blanco forman una notoria línea lateral.
Hábitat y distribución	Reside en humedales con vegetación, canales, ríos y riberas.

	Se distribuye por zonas bajas desde el Valle de Copiapó hasta Chiloé. Ocasional por la zona centro sur de Magallanes y Tierra del Fuego. También se encuentra en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Hábitos	Viven en comunidad, se asocia a otras especies de tagua, especialmente en invierno. Come plantas en la superficie y se esconde entre la vegetación.

Nombre común	Taguita
Nombre científico	<i>Porphyriops melanops</i>
Orden	Gruiformes
Familia	Rallidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico corto y escudo frontal pequeño, ambos color verde lima. Patas café oliva con dedos muy largos. Iris rojizo. La zona frontal de la cara y corona son negras, en tanto el resto de la cabeza, cuello, pecho y zona superior del abdomen son color gris pizarra, zona baja del abdomen color blanco. Zona superior del cuerpo café oliva con tonos castaños en escapulas y coberteras. Cola negra por la parte superior, por debajo, las subcaudales blancas forman un parche lateral.
Hábitat y distribución	Reside en cuerpos de agua abiertos de agua dulce como humedales con vegetación ribereña, además de ríos y canales. Se distribuye por zonas bajas y costeras desde el Valle de Copiapó hasta Chiloé. Existe avistamiento de esta especie en Isla Santa María, Biobío. Igualmente se encuentra en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.
Hábitos	Parejas o familias, ocasionalmente en bandadas de pocos individuos. Territorial en época reproductiva. Se alimenta al nadar y se sumerge en el agua ante amenaza.

Nombre común	Tenca
Nombre científico	<i>Mimus thenca</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Mimidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor

Identificación	Posee pico oscuro con leve curvatura. Presenta línea superciliar blanca la cual contrasta con línea ocular negra. La zona superior del cuerpo, incluyendo la corona, varía entre colores café grisáceo a ahumado. Alas y cola del color del dorso. La parte interna de la cola posee un color blanco en la mitad distal. La zona inferior del cuerpo varía entre colores blancos a ante grisáceo con notorias líneas oscuras en flancos.
Hábitat y distribución	Reside en laderas, matorrales, pastizales, parques y cultivos, aunque prefiere zonas semi áridas. Se distribuye desde el Valle de Copiapó hasta Chiloé y Palena en la región de Los Lagos. Aunque es endémica , existen registros de avistamiento en Neuquén, Argentina.
Hábitos	Solitaria o en pareja, además se reúne en grupos para comer. Imita el canto de otras aves, canta todo el año. Se esconde entre arbustos cuando es molestada. Se alimenta de insectos en el suelo.

Nombre común	Tijeral
Nombre científico	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color negro, corto, grueso y en punta. Patas color gris. Corona oscura con estriado canela semi erecta. Presenta una línea superciliar y estrías en la nuca blanquecinas. Zona superior del cuerpo color café con tonos grises. Alas con notable panel rufo al estar en reposo. Cola muy larga café oscuro con plumas puntiagudas de borde blanco. Zona inferior del cuerpo gris con tonos canela en flancos y subcaudales, a excepción de la garganta que es blanca, además presenta finas líneas blancas en el pecho.
Hábitat y distribución	Reside en zonas arbustivas, parques, ambientes con vegetación, igual ingresa a las ciudades. Se distribuye en zonas bajas comprendidas entre Coquimbo y Chiloé. En invierno migra hacia la zona central de Argentina.
Hábitos	Solitario, parejas o grupos pequeños. Habita las partes interiores de los arbustos, colgándose de las ramas. Posee un trino característico, muy territorial.

Nombre común	Tiuque
Nombre científico	<i>Milvago chimango</i>
Orden	Falconiformes
Familia	Falconidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee cera color amarillo, pico córneo con tonos azules en la base. Las patas del macho son color amarillo mientras que en la hembra son color gris. El cuerpo presenta una coloración que va desde un café oscuro a un café canela con tinte amarillo. La garganta y subcaudales son color blanco. Alas café oscuro con panel café amarillento en plumas de la zona exterior. La cola posee una banda subterminal café oscuro y una terminal color blanco. Juvenil: Pico color gris oscuro con cera rosada. Coloración café amarillenta con tinte café oscuro y patas córneas.
Hábitat	Reside en todo tipo de ambientes, incluso cercano a zonas urbanas, basurales y costas. Se distribuye desde Copiapó hasta Magallanes, presente en Cabo de Hornos y es introducido en Isla de Pascua.
Hábitos	Solitario o parejas, aunque también pueden vivir en comunidad llegando a ser muy numerosa y duermen todos juntos. Es de tipo carroñero, aunque en ocasiones caza o preda pequeños ratones e insectos. Caminante y ruidoso, especialmente en época de reproducción.

Nombre común	Torcaza
Nombre científico	<i>Patagioenas araucana</i>
Orden	Columbiformes
Familia	Columbidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color negro, patas rojas coral e iris anaranjado. El cuerpo es color morado pálido vino, presenta un parche en la nuca color verde iridiscente bajo una franja color blanco. Coberteras alares gris pizarra y cola en el mismo color con banda subterminal negra.
Hábitat y distribución	Reside en zonas boscosas, praderas y arboledas naturales.

	Se distribuye desde La Serena hasta Taitao en la región de Aysén, aunque ocasionalmente se puede encontrar en el Canal Beagle. También se distribuye por Argentina, desde Neuquén hacia la zona sur.
Hábitos	Bandadas pequeñas, aunque se unen en grupos numerosos para alimentarse. Es arbórea, se observa más arriba del follaje. Come diversos frutos. Canto repetitivo y de tono grave.

Nombre común	Tordo
Nombre científico	<i>Curaeus curaeus</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Icteridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico oscuro, de similar largo de la cabeza, de aspecto recto y agudo. Grandes patas negras. Cola alargada con forma cuadrada. El cuerpo presenta una coloración negra brillante. Juvenil: Posee tonos cafés en alas y en algunos se observan cejas color ocre.
Hábitat y distribución	Reside en zonas con vegetación, campos agrícolas, parques y jardines, sobre todo en época de invierno. Se distribuye desde la zona sur de Atacama hasta el Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos. Igualmente se encuentra en la zona sur de Argentina.
Hábitos	Muy sociable, habitualmente en bandadas, las cuales se mueven en conjunto. Su canto es melodioso y agudo. Come de manera grupal de preferencia en el suelo, aunque también come frutos arbustivos.

Nombre común	Tórtola
Nombre científico	<i>Zenaida auriculata</i>
Orden	Columbiformes
Familia	Columbidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico color negro, patas color rojo e iris oscuro con anillo orbital azul. Coloración café grisáceo con tonos vino en cabeza y zona inferior. Presenta una pequeña hendidura en zona auricular color negro, además de manchas a los lados del cuello en tono bronceado iridiscente. Alas color gris con tonos oliva y manchas ovaladas oscuras en coberteras. Cola

	color café con toques grises, presenta una banda subterminal oscura y un notorio borde blanco.
Hábitat y distribución	Reside en zonas naturales y urbanas. Especie con gran rango de distribución, presente en Isla Santa María e Isla Mocha en Biobío hacia el sur hasta Puerto Williams.
Hábitos	Parejas o bandadas pequeñas. Anida en colonias, duermen y comen en grupos. Vuela rápido y a baja altura.

Nombre común	Tortolita cuyana
Nombre científico	<i>Columbina picui</i>
Orden	Columbiformes
Familia	Columbidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico oscuro con borde blanco en la mandíbula. Patas cortas color rosado. Presenta anillo orbital que va desde un color blanco a uno celeste, además el iris es morado con centro blanco. El macho es color gris azulado en corona y nuca. El cuerpo tiene una coloración café grisácea con tonos pálidos en la zona inferior sobre todo en abdomen y subcaudales. En vuelo se observa una delgada banda alar color blanco. Cola color gris azulada con plumas exteriores blancas.
Hábitat y distribución	Reside en campos abiertos con vegetación dispersa, laderas de cerros, zonas de cultivo, además de jardines y plazas. Se distribuye entre Copiapó y Llanquihue, existen registros aislados en Baquedano (Antofagasta) y Chiloé. Igualmente se encuentra en Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil.
Hábitos	Parejas o bandadas pequeñas. Camina balanceándose y descansa sentada en ramas arbóreas. Vuela a baja altura haciendo mucho ruido. Emite silbidos en serie de baja frecuencia.

Nombre común	Trabajador
Nombre científico	<i>Phleocryptes melanops</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Furnariidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor

Identificación	Posee pico largo, agudo y sutilmente curvo color negro, pálido en la base mandibular. Patas color gris. Notoria línea superciliar notoria color ante, corona y aurículas café oscuro. Parte superior del cuerpo café oscuro con tonos ante y blanco a excepción de la nuca, manto y rabadilla presentan coloración café oliva. Las escapulares son gris azulado con fino estriado blanco. Alas oscuras con banda alar rojiza en rémiges. Cola café oscuro con plumas centrales canela terminadas en prolongación del raquis a modo de espinas. Parte inferior del cuerpo color ante, más oscuro por los flancos. Juvenil: De coloración más oscura, partes inferiores color canela en vez de ante como los adultos.
Hábitat y distribución	Reside en juncos y totorales a orillas de humedales de poca profundidad. Se distribuye por la mayor parte del territorio, presente en Isla Santa María en el Biobío, también se encuentra en zona transicional de estepa patagónica en Aysén y Magallanes.
Hábitos	Solitario o parejas. Emite sonido similar a un martilleo en serie. Los nidos tienen forma de bóvedas y los ocultan entre los juncos.

Nombre común	Traro
Nombre científico	<i>Caracara plancus</i>
Orden	Falconiformes
Familia	Falconidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Presenta cera naranja, pico color cuerno con tono azulado en la base y patas amarillas anaranjadas. Corona color negro con pequeña cresta. Garganta blanca con lados de la cara café con tinte amarillo. Zona superior del cuerpo café oscuro con escamado blanco, esto a excepción del pecho, cuello y manto los cuales son blancos con finas líneas café. Cola color blanco con tonos café y banda terminal oscura. Zona inferior del cuerpo café oscuro sin contar subcaudales las cuales son blancas. posee alas largas con forma cuadrada color café oscuro con un parche blanco en la base de las plumas. Juvenil: De coloración café oscuro con garganta y laterales de la cara en tonos ocre, además posee

	vistas líneas ante por el cuello y pecho las cuales se extienden hasta la espalda. La cera del pico es rosada y patas color cuerno.
Hábitat y distribución	Reside en todo tipo de ambientes e interiores de ciudades, esto último en su rango sur. Se distribuye por el extremo norte de Atacama por zona costera, común por la región del Biobío hacia el sur. Se encuentra en Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez.
Hábitos	Solitario, parejas o grupos sobre todo en invierno. Aunque es más bien carroñero igual preda mamíferos y otras aves más pequeñas. Durante la época de reproducción emite un sonido similar a “caracara”.

Nombre común	Treile/Queltehue
Nombre científico	<i>Vanellus chilensis</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Charadriidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico rosado con punta negra. Patas rosadas e iris rojizo. Cabeza cuello son color gris, además presenta filoplumas oscuras en la nuca. Frente, garganta y pecho color negro. Zona superior café grisáceo con tornasolado verde, las alas presentan el mismo patrón de colores, aunque por el dorso presenta una banda blanca formada por las coberteras mayores. Cola color blanco con banda subterminal negra.
Hábitat y distribución	Reside en zonas llanas con poca vegetación como praderas. Igualmente, al interior de ciudades. Se distribuye desde Atacama hasta Chiloé, ocasionalmente se encuentra en Antofagasta. Hacia el sur se distribuye desde Aysén hasta el Canal Beagle, estos ejemplares migran hacia el norte en invierno.
Hábitos	Solitario o pareja, aunque se reúnen en bandadas numerosas antes de migrar. Ataca a los intrusos en grupo o parejas.

Nombre común	Trile
Nombre científico	<i>Agelasticus thilius</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Icteridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave con dimorfismo sexual. Macho: Posee pico color negro, largo y agudo, patas en el mismo color. Coloración negro brillante a excepción de hombros, coberteras menores y subalares las cuales son color amarillo brillante, esta característica de su plumaje es más visible en vuelo. Hembra: Posee pico color gris y patas oscuras, además de una notoria y larga línea superciliar color blanco. Cabeza y zona superior del cuerpo color café grisáceo, además las plumas del manto tienen un fino borde color ante, zonas inferiores color ante grisáceo con líneas oscuras. Igual que el macho es de coloración amarilla en hombros y parte del ala, aunque de menor tamaño. Juvenil: Similar a la hembra con línea superciliar blanca menos notoria.
Hábitat y distribución	Reside en zonas húmedas bordeadas de totoras, juncos y pastizales cercanos. Se distribuye entre Atacama hasta Chiloé y Llanquihue en la región de Los Lagos, más al sur se encuentra en Aysén y Magallanes, estos últimos migran hacia el norte en época de invierno.
Hábitos	Solitario, parejas o grupos pequeños. Vive entre los pajonales en colonia junto a otras especies, busca invertebrados para comer entre juncos y plantas flotantes. Puede ser parasitado por el Mirlo.

Nombre común	Tucúquere
Nombre científico	<i>Bubo magellanicus</i>
Orden	Strigiformes
Familia	Strigidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico negro, además de patas y dedos emplumados con garras oscuras. Iris color amarillo con borde oscuro, presenta párpado emplumado. Disco facial gris con fino delineado negro. Presenta dos penachos auriculares.

	La zona superior del cuerpo va desde un color ante a un gris pálido con tinte café oscuro a excepción del parche gular que es color blanco. La zona inferior va desde un color blanco a ocre con líneas transversales café oscuro. De largas alas y cola corta con forma redondeada. En los ejemplares patagónicos se observa fase clara y oscura en la cual cambia el color de las plumas.
Hábitat y distribución	Reside en bosque abierto y renoval, además de zonas rocosas. Se distribuye por todo Chile, el registro más austral de esta especie es en islas cercanas al Canal Beagle.
Hábitos	Solitario, parejas o familias. De hábitos nocturnos, caza animales pequeños como aves y mamíferos. Ulula durante el crepúsculo y la noche, mientras que durante el día duerme inmóvil en ramas o en el suelo. Anida en árboles, acantilados, quebradas o en el suelo entre el matorral o la base de los árboles.

Nombre común	Urco / Diucón
Nombre científico	<i>Xolmis pyrope</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico corto, agudo color negro al igual que sus patas. Característicos ojos rojo. Corona pizarra con resto de partes superiores color gris ceniza. Cola gris oscuro con borde externo blanco. Partes inferiores claras a excepción del pecho el cual es color gris ceniza. Ejemplar juvenil similar al adulto a excepción del iris, el cual es café.
Hábitat y distribución	Reside en bosques abiertos con zonas arbustivas conjuntas. En invierno suele encontrarse cerca de ciudades y parques. Se distribuye desde Coquimbo hasta Tierra del Fuego incluyendo Cabo de Hornos. Durante el invierno migran hacia el norte pudiéndose encontrar desde Atacama hasta la costa de Antofagasta. La raza <i>fortis</i> es endémica de Chiloé Igualmente se encuentra en zonas forestadas en Argentina.

Hábitos	Solitario, pareja o grupos pequeños. Gusta posarse en partes altas del follaje. Emite un silbido corto y débil. Se alimenta de insectos y caza cuncunas.
----------------	--

Nombre común	Vari
Nombre científico	<i>Circus cinereus</i>
Orden	Accipitriformes
Familia	Accipitridae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Presenta dimorfismo sexual, ave rapaz, planeador, con alas y cola de gran longitud, pico color gris azulado con punta oscura y cera amarilla, patas en el mismo tono. Macho: Cabeza, pecho y partes superiores color gris en tonos variados. Cara interna del ala color blanco, contrastante con primarias y secundarias oscuras. Parte baja del abdomen y zonas inferiores claras con patrón rufo. Cola color gris con patrón oscuro, al igual que la banda subterminal. Hembra: Presenta una mancha a semejanza de collar color blanco, al igual que la cara y línea superciliar. Partes superiores color café oscuro con sutil moteado claro. Cola color ocre con líneas gruesas oscuras, zona inferior blanca con patrón café. Juvenil: zona superior y alas café oscuro con escamado ocre, zona inferior ocre con estriado café.
Hábitat y distribución	Reside en zonas abiertas, pastizal, zonas de cultivo, estepa, laderas con matorral disperso y bosques. Se distribuye en zonas bajas desde Copiapó hasta Chiloé, por el sur se encuentra en Aysén y parte de Magallanes durante el verano. Se encuentra también en Islas Malvinas.
Hábitos	Solitario, pareja o grupos pequeños. Agresivo y territorial en época reproductiva. Anida entre la vegetación a orillas de lagunas. Largos planeos a baja altura. El macho es polígamo, tiene más de una pareja.

Nombre común	Viudita
Nombre científico	<i>Colorhamphus parvirostris</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Tyrannidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico corto y agudo en tonos oscuros, al igual que las patas y aurículas. Cabeza y pecho color gris pizarra, el resto de las zonas superiores son gris acanelados. Alas oscuras con dos finas bandas color canela. Cola café oscuro con borde externo color blanco. Resto del cuerpo color gris con un tono amarillo pálido en el abdomen.
Hábitat y distribución	Reside en bosques, huertos y parques. Se distribuye desde la zona centro norte hasta el Maule y Tierra del Fuego, además en invierno migra hacia el norte.
Hábitos	Solitario o parejas, vive en el follaje, se posa en las alturas de árboles muertos preferentemente desde donde realiza cortos vuelos para cazar insectos. Silbido agudo.

Nombre común	Yal
Nombre científico	<i>Phrygilus fruticeti</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Thraupidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Ave con dimorfismo sexual. Macho: Coloración gris pizarra oscuro, pico y patas amarillo anaranjadas. Presenta una mancha en la cara a modo de máscara que se extiende por el pecho, de coloración oscura, aunque en algunos ejemplares ésta llega hasta el abdomen. Corona gris con jaspeado oscuro. El manto puede variar desde un color ocre a un gris pizarra, en ambos casos presenta estriado oscuro. Parte baja del abdomen color blanco y alas oscuras con dos bandas blancas. Hembra: Pico y patas amarillas con tonos rosa, coloración ocrácea con partes inferiores con tonos más grises. Aurículas castañas, garganta blanca contrastante con banda malar oscura y pecho con jaspeado oscuro.
Hábitat y distribución	Reside en zonas semi áridas con vegetación como cactus o arbustos.

	Se distribuye por todo el país, moviéndose por este dependiendo de la disponibilidad de recursos. Se encuentra también en Argentina y zona andina de Perú y Bolivia.
Hábitos	Grupos familiares, bandadas pequeñas o numerosas. Es más bien terrestre, aunque puede verse posado en arbustos. Trino repetitivo. Realiza vuelo nupcial en época de apareamiento.

Nombre común	Yeco
Nombre científico	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>
Orden	Suliformes
Familia	Phalacrocoracidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee cuello corto de aspecto grueso. Pico color gris oscuro, con color amarillo en la base de la mandíbula. Posee un llamativo iris color calipso. En época reproductiva la comisura del labio es blanca, igualmente puede presentar plumas delgadas del mismo color en cabeza y cuello. Cuerpo de coloración negra apizarrada. Juvenil: De color café ahumado con tonos blancos, además el pico es amarillo con negro en la punta.
Hábitat y distribución	Cuerpos de agua hacia el interior con abundancia de peces. También habita costas marinas, desembocaduras y ríos. Se distribuye a lo largo de todo el territorio continental, además está presente sur y centro América
Hábitos	Viven en colonias, vuelan en formación “V” a gran altura. Descansa extendiendo sus alas para secarse. Anida en los árboles entre primavera y verano.

Nombre común	Zarapito
Nombre científico	<i>Numenius phaeopus</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Scolopacidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico alargado y curvo. Dos tipos de plumaje. Plumaje no reproductivo: Pico oscuro de color rosado en mandíbula y patas grises. La zona superior del cuerpo incluyendo cabeza y cuello, son color blanco con tinte café oscuro. Presenta dos líneas

	negras por la corona y la nuca, además de una banda ocular en el mismo color. Alas y espalda color café oscuro variable con motas blancas al igual que rabadilla y cola, aunque estas no presentan moteado. Garganta y abdomen blancos, este último con tonos ocre. Plumaje reproductivo: El pico se torna completamente negro. Juvenil: Existe presencia de escamas blancas en coberteras alares. Pico negro, más corto y un color pálido en la base.
Hábitat y distribución	Reside en costas marinas, planicie intermareal, desembocaduras y zonas llanas costeras. En verano se distribuye desde el norte hasta Tierra del Fuego. En invierno migra por costas australes de Sudamérica y en otoño hacía zonas árticas de Norteamérica donde anida.
Hábitos	En grupos llegando a formar numerosas bandadas. Se alimenta en playas donde busca crustáceos y gusanos. En marea alta descansa en la orilla, en zonas interiores en ramas o troncos. Emite un sonido repetitivo y fuerte.

Nombre común	Zarapito pico recto
Nombre científico	<i>Limosa haemastica</i>
Orden	Charadriiformes
Familia	Scolopacidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Posee pico largo y curvado hacía arriba color negro con base rosada, patas color negro largas. Dos plumajes. Plumaje no reproductivo: Coloración gris ahumado, con línea superciliar blanca y corona oscura. Dorso, escapulas y coberteras gris blanquecino. Rabadilla blanca y cola negra. Axilas negras, abdomen y subcaudales blancas. Plumaje reproductivo: Partes inferiores incluyendo el cuello son de coloración rufa con tonos blancos en flancos. Plumaz cafés oscuro con tinte café amarillento y blanco. Juvenil: Posee un plumaje similar al que posee en reposo (no reproductivo), plumas dorsales café con escamado blanco y línea superciliar más notoria.

Hábitat y distribución	Reside en playas y costas marinas lodosas, además de zona intermareal. Se distribuye por Reloncaví, Chiloé y la costa del Estrecho de Magallanes. Migra por costas australes de Sudamérica en invierno, en otoño migra a Norteamérica, hacia zonas árticas donde anida.
Hábitos	Formas bandadas de numerosos individuos, busca alimento como cangrejos y moluscos pequeños en playas limosas. Es una especie migratoria que realiza viajes directos recorriendo grandes distancias.

Nombre común	Zorzal
Nombre científico	<i>Turdus falcklandii</i>
Orden	Passeriformes
Familia	Turdidae
Estado de conservación	LC, preocupación menor
Identificación	Existen dos razas reconocidas en Chile, <i>magellanicus</i>, la cual posee patas, pico y anillo orbital amarillo anaranjado. Presenta dimorfismo sexual. Macho: Coloración oscura en la capucha, zona superior del cuerpo y coberteras color café grisáceo. Cola oscura. Zona inferior varía entre tonos ante y canela grisáceo, en ambos casos se presentan estos colores con tinte amarillo a excepción de la garganta, la cual es blanca con estriado oscuro. Hembra: Similar al macho, aunque con un tono más pálido y un café más notorio en zona superior y pecho. Capucha poco vistosa. Juvenil: Zona inferior del cuerpo ocrácea con abundante moteado oscuro en pecho y abdomen. Pico color amarillo y patas color carne. Y raza <i>mochae</i>, de mayor tamaño y con pico más alargado. De coloración más pálida y zona inferior del cuerpo color gris variable.
Hábitat y distribución	Reside en bosques, zonas con vegetación y ambientes húmedos, igualmente presente en ciudades, parques y jardines. Se distribuye desde Atacama hacia la zona sur, incluyendo Isla Robinson Crusoe y Juan Fernández. Raza <i>mochae</i>, es endémica de la Isla Mocha, aunque actualmente esta información está desestimada.

	Igualmente se encuentra en zonas cercanas de Argentina.
Hábitos	Solitario o parejas, en tiempos no reproductivos se asocia en bandadas. Activo, salta entre el follaje. Muy ruidoso e imita cantos de otras aves.